

УДК: 615.1/2: 33 (075.8)

VEN/ЧАСТОТНИЙ АНАЛІЗ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Герасимова О.О., Кузнецов І.Е., Шира К.М.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків

На даний час проблема нераціонального використання лікарських препаратів (ЛП) існує в усіх країнах світу і потребує вирішення як на рівні держави, так і окремого закладу охорони здоров'я. Застосування фармакоекономічних підходів для оцінки призначень ЛП в реальній клінічній практиці сприяє оптимізації як фармакотерапії, так і грошових коштів на її проведення.

Мета даної роботи – визначити частоту та необхідність призначень ЛП пацієнтам з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки (ВХДК) в гастроентерологічному відділенні однієї з клінік м. Харкова.

Методи дослідження: допоміжні види фармакоекономічного аналізу - частотний та VEN-аналізи. VEN-аналіз проводили за «формальною» ознакою: при наявності ЛП в Державному формулярі України (IV випуск) він отримував індекс V, при відсутності в ньому - індекс N.

Аналіз 132 історій хвороб пацієнтів з ВХДК віком від 18 до 37 років дозволив визначити 56 ЛП 23 фармакологічних груп. Серед них найчастіше призначались ЛП для етіотропної та патогенетичної терапії ВХДК. Безумовний лідер призначень - гастропротектор «Де-нол» («Astellas Pharma Europe», табл. 120 мг №112) - 13,11% від загального числа призначень. За результатами VEN-аналізу значна кількість ЛП (85,71%) входила в групу V. Вони склали більшу частину лікарських призначень - 94,39 %.

В цілому, призначення ЛП досліджуваним пацієнтам з ВХДК можна вважати раціональними та доцільними. Результати проведеного дослідження можуть служити підґрунтям для подальшого вдосконалення фармакотерапії пацієнтів з ВХДК в даному відділенні.