

ОЦІНКА ЯКОСТІ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ГАСТРИТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ VEN/ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗУ

Герасимова О.О., Кузнецов І.Е., Морус Т.В.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

gerasimowa.o@yandex.ua

Вступ. Оцінка використання лікарських препаратів (ЛП) в реальній клінічній практиці є необхідною для вирішення питань щодо проведення раціональної фармакотерапії захворювань. Використання з цією метою допоміжних фармакоекономічних методів – VEN- та частотного аналізів – дозволяє оцінити якість призначеної фармакотерапії з клінічної точки зору.

Мета даної роботи – визначити частоту та необхідність призначень ЛП пацієнтам з хронічним гастритом (ХГ) в одному із закладів охорони здоров'я (ЗОЗ) м. Харкова.

Методи дослідження: частотний та VEN-аналізи. VEN-аналіз проводили за «формальною» ознакою: при наявності ЛП в Державному формулярі України (V випуск) він отримував індекс V, при відсутності в ньому - індекс N.

Результати дослідження. Аналіз 105 історій хвороб пацієнтів з ХГ віком від 35 до 59 років дозволив визначити 47 ЛП 21 фармакологічної групи, що використовувались для лікування захворювання. Серед них найчастіше призначались ЛП для етіотропної та патогенетичної терапії ХГ. Лідер призначень – гастропротектор «Де-нол» («Astellas Pharma Europe»; табл. 120 мг № 56; 9,96 % від загального числа призначень). За результатами VEN-аналізу значна кількість ЛП (87,23%) входила в групу V. Вони склали більшу частину (91,15 %) лікарських призначень.

Висновки. В цілому, призначення ЛП досліджуваним пацієнтам з ХГ можна вважати раціональними та доцільними. Результати проведеного дослідження можуть служити підґрунтям для подальшого вдосконалення фармакотерапії пацієнтів з ХГ в даному ЗОЗ (8,85% призначень ЛП з індексом N) та для перегляду локального формуляру.