

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗА НАЗНАЧЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БОЛЬНЫМ С ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Кобец М.Н., Кобец Ю.Н., Филипцова О.В.

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина

may4ok777@yahoo.com

Депрессивные расстройства являются самыми распространенными из всех психических расстройств и имеют социальное значение поскольку относятся к классу болезней, приводящих к потере работоспособности и занимают первое место среди причин отсутствия на работе.

Целью работы является определение основных схем лечения больных с депрессивными расстройствами и определение препаратов-лидеров по частоте назначений для лечения больных с депрессивными расстройствами в ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины» г. Харькова.

Материалы и методы. Частотный анализ назначений лекарственных средств больных с депрессивными расстройствами. Для анализа использованы медицинские карты 94 стационарных больных с данным диагнозом (фрагмент исследования).

Результаты исследования. В ходе исследований установлены препараты-лидеры по частоте назначений (ЧН): амитриптилин (69), доксепин (27), пароксин (34) – антидепрессанты; гидазепам (61) – транквилизатор; карбамазепин (52) – противосудорожное средство; пирацетам (44) – ноотропное средство; эглонил (25), сульпирид (20) – антипсихотики; рибоксин (23), тиотриазолин (17) – средства, влияющее на процессы тканевого обмена.

Выводы. В ходе анализа определены основные направления фармакотерапии больных с депрессиями, которые в целом соответствуют требованиям действующего Унифицированного клинического протокола (Приказ МЗ Украины № 1003 от 25.12.2014 г.). Почти 20% назначений относятся к главному направлению лечения – назначению антидепрессантов и антипсихотиков.