

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАННЯ ПРОТИВІРУСНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

Висоцька А.І.¹, Ткачова О.В.², Яковлева Л.В.²

¹Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

²Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Вступ. Гепатити – це гострі та хронічні захворювання печінки. Переважно першопричина виникнення гепатиту - це віруси, але варто відзначити, що винуватцями служать і різноманітні інфекції, надмірне споживання алкоголю, наркотичних речовин, медичних препаратів. Найчастіше зустрічаються три його типи – гепатит А, В і С. І саме гепатити В і С – два основних типи, що є причиною 96% всіх випадків смерті від інфекційних гепатитів. До етіотропних лікарських засобів, що застосовуються з метою лікування вірусних гепатитів, відносяться противірусні лікарські засоби (ПЛЗ). Своєчасне призначення ефективних ПЛЗ у хворих на гепатити в більшості випадків дозволяє запобігти розвитку ускладнень і прискорити видужання. Якщо ефект терапії зберігається більше ніж 48 тижнів після закінчення лікування вірусного гепатиту, то пацієнт вважається вилікованим, але на жаль успішна противірусна терапія не є гарантією від повторного інфікування [1].

Мета дослідження – розрахунок обсягів споживання ПЛЗ для лікування вірусних гепатитів на фармацевтичному ринку України за 2016-2018 рр.

Матеріали та методи. Споживання ПЛЗ оцінювали за АТС/DDD методологією, рекомендованою ВООЗ. Для розрахунку споживання ПЛЗ використаний показник DDDs/1000/день, що відповідає DID [2].

Результати дослідження. ПЛЗ для лікування хворих на вірусні гепатити протягом 2016-2018 рр. були представлені на ринку у вигляді 4 МНН в дуже обмеженій кількості торгових назв (ТН) – 3-5 ТН ЛЗ з досить високими цінами від 1445,35 до 13119,09 грн. Загальне споживання всіх ПЛЗ було дуже низьким, але щороку зростало і становило 0,0032 DID (2016 р.); 0,0046 DID (2017 р.); 0,010 DID (2018 р.). Лідерами за споживанням були препарати тенофовіру дизопроксил (0,0031-0,010 DID) та софосбувіру (0,00032-0,000021 DID). Першу позицію займав МНН тенофовіру дизопроксил, представлений однією ТН – ЛЗ «Віреад». Другу позицію займали препарати МНН софосбувіру, представлені двома ТН «Гратеціано» і «Совалді». Менше всього споживався МНН тельбивудін (0,00000058 DID), який у 2018 р. вийшов з ринку.

Висновок. Показники споживання ПЛЗ для лікування хворих на вірусні гепатити в Україні дуже низькі (0,0032-0,010 DID), що може бути пов'язано з високою вартістю лікування та низькою частотою призначення противірусних препаратів хворим на вірусні гепатити.

Список літератури:

1. Порохницький В.Г., Топольницький В.С. Вірусні гепатити, Київ: Книга-Плюс, 2010. 560 с.
2. Вивчення споживання лікарських засобів за анатомо-терапевтично-хімічною класифікацією та встановленими добовими дозами: метод. рек. / А. М. Морозов, Л. В. Яковлева, А. В. Степаненко та ін. Харків: Стиль-Іздат. 2013.