

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ТА ХВОРИХ НА СНІД В УКРАЇНІ

Цурикова О. В., Панфілова Г. Л.

*Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
Кафедра управління, економіки та забезпечення якості у фармацевції*

Кафедра організації та економіки фармацевції

zurikova2008@gmail.com

Вступ. Пандемія ВІЛ і СНІДу є найважливішою проблемою, яка повинна вирішуватися зусиллями всіх впливових міжнародних організацій та фондів. В Україні, на жаль, проблема захворюваності населення на ВІЧ є актуальною, незважаючи на значні зусилля держави та міжнародних суспільних фондів й благодійних організацій.

Методи дослідження. Порівняльний, логічний історичний, аналітичний, математико-статистичний тощо. У дослідженнях використовувалися дані «Центру Громадського здоров'я МОЗ України. Статистика з ВІЛ та СНІДу» МОЗ України (URL: <https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid>).

Результати дослідження. За даними аналізу даних, що представлені на офіційному сайті «Центру громадського здоров'я» МОЗ України (Інформаційний бюлетень №50) нами був проведений аналіз динаміки змін кількості ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД упродовж 2014-2019 рр.. Встановлено, що найбільший приріст (%) зазначених показників спостерігався у 2016 р. (36474 осіб проти 31509 чоловік у попередньому 2015 р., приріст 16,0%). Середній показник коефіцієнтів росту/зниження дорівнює 1,01. Визначено, що прогнозована кількість осіб, які можуть знаходитись на офіційному обліку у спеціалізованих закладах МОЗ України з приводу ВІЧ-позитивного статусу у 2021 р. може скласти 139089 чоловік, а хворих на СНІД – 50282 пацієнтів. Доведено, що протягом 2014-2020 рр. у загальній сукупності хворих істотно переважали ВІЧ-інфіковані (від 74,43% у 2019 р. до 81,48% за даними 2014 р.). Загальна кількість зазначених груп населення в Україні може дорівнювати значенню 189167 осіб, що на 1,3% більше ніж показники 2020 р. та 6,6% більше, ніж за даними 2014 р.. У прогнозованій кількості хворих на 2021 р. переважали також ВІЛ-інфіковані (73,53%).

Висновки. Підсумовуючи результати проведених досліджень можна стверджувати про необхідність впровадження ефективних програм профілактики та раннього виявлення цього загрозливого захворювання в популяції.