

## ОЦІНКА СТАНУ РОЗВИТКУ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ПО ХВОРОБІ ХОДЖКІНА В УКРАЇНІ У ДИНАМІЦІ РОКІВ

Панфілова Г. Л., Матушак М. Р.

*Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна*

*Кафедра соціальної фармації*

*ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»,*

*м. Чернівці, Україна*

*Кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії*

**matushakmarta@gmail.com**

**Вступ.** За умов перманентного дефіциту коштів у вітчизняній охороні здоров'я (ОЗ) все більшого значення набувають питання аналізу епідеміологічних показників, насамперед захворюваності та смертності населення від різних патологій. З кожним роком все більше уваги приділяється саме онкологічним патологіями, до яких й відноситься хвороба Ходжкіна (ХХ).

**Методи дослідження.** Об'єктом досліджень стали дані Національного канцер-реєстру (2012-2018 рр.). Застосовувалися аналітико-порівняльний, логічний, математико-статистичний, також методи епідеміологічних досліджень.

**Результати дослідження.** Доведено, що захворюваність та смертність дорослого та дитячого населення від ХХ, що виражені в абсолютних показниках упродовж 2012 р.-2018 р. в Україні знизилась. Кількість захворівших на ХХ у 2012 р. порівняно з даними 2018 р. зменшилась на 26,9%, а смертність – на 41,2%, серед дітей – на 37,7% та 25,0% відповідно. Позитивним виглядає той факт, що після 2015 р. показники захворюваності дітей на ХХ планомірно знижувалися. Доведено, що у сукупності показників захворюваності жінки превалювали (53,4%), а у структурі смертності навпаки питома вага (%) жінок була меншою (43,0%). Серед дитячого контингенту хворих, більше було представників чоловічої статі (53,0%). За даними аналізу відносних епідеміо-логічних показників серед чоловіків встановлено, що середнє значення захворюваності (2,29 на 100 тис. населення) в Україні не перевищувало відповідні дані світової епідеміології (2,3 на 100 тис. населення) на ХХ. При цьому, серед жінок аналогічний показник (2,46 на 100 тис. населення) значно перевищував відповідні світові показники (1,9 на 100 тис. населення). Середнє значення відносних показників смертності від ХХ, яке було нами розраховано упродовж 2012-2018 рр. дорівнювало для чоловіків 0,69, а для жінок - 0,47, проти світових даних 0,4 і 0,3 відповідно на 100 тис. населення.

**Висновки.** Доведено, що у відносних показниках відбувається зростання захворюваності серед жінок, а також смертності від ХХ серед дорослого контингенту хворих.