

## ОЦІНКА ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ В УКРАЇНІ

*Герасимова О.О., Гордієнко Т.С.*

**Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна**

**Вступ.** Функціональні розлади шлунково-кишкового тракту є широко розповсюдженими у всьому світі [1,2]. У зв'язку з цим лікарські засоби (ЛЗ) для їх корекції є затребуваними серед населення.

**Мета дослідження.** Визначити обсяги реалізації ЛЗ, що застосовуються у разі функціональних шлунково-кишкових розладів (група А03), в Україні у 2020-2022 роках.

**Методи дослідження.** У роботі використані методи маркетингового дослідження фармацевтичного ринку. Визначення міжнародних непатентованих назв і торгових найменувань (ТН) представників групи А03 на фармацевтичному ринку України та обсягів їх реалізації в натуральних одиницях в країні в 2020-2022 роках проводили за даними системи дослідження ринку «Pharmexplorer» компанії «Моріон».

**Основні результати.** В 2020 році на українському фармацевтичному ринку було реалізовано 24403363 упаковки ЛЗ групи А03, в 2021 році 24315374 упаковки, в 2022 році 20260793 упаковки. З роками обсяги реалізації досліджуваних ЛЗ зменшились. Серед ЛЗ групи А03 найбільші обсяги реалізації в натуральних одиницях в Україні у досліджуваній період встановлені для підгрупи А03А «Засоби, що застосовуються у разі функціональних розладів з боку шлунково-кишкового тракту», найменші для підгрупи А03В «Прості препарати беладонни та її похідних». Лідери за кількістю реалізованих упаковок серед ТН препарати дротаверину, симетикону та ЛЗ, що містять комплекс «метамізол натрій + пітофенон + фенпіверінія бромід». Слід зазначити, що протягом 2020-2022 років одні і ті ж їх ТН займали провідні позиції в рейтингу за кількістю реалізованих упаковок: 2020-2021 роки – Но-Шпа, Sanofi, табл. 40 мг №24 (кількість реалізованих упаковок відповідно, 4022995 та 4081287), 2022 рік – Спазмалгон, Teva, табл. №20 (кількість реалізованих упаковок 3368766).

**Висновки.** Обсяги реалізації представників групи А03 «ЛЗ, що застосовуються у разі функціональних шлунково-кишкових розладів» в натуральних одиницях варіювали в Україні в 2020-2022 роках. Провідні позиції за обсягами реалізації займали ТН дротаверину, симетикону та ЛЗ, що містять комплекс «метамізол натрій + пітофенон + фенпіверінія бромід».

### **Список літератури:**

1. Корендович І.В., Бабенко Т.О. Функціональні розлади шлунково-кишкового тракту в дітей та підлітків // Практикуючий лікар. – 2016. – Т.5, № 3. – С. 12-16.
2. Палій І.Г., Заїка С.В., Ткачук І.В. Діагностика функціональних розладів стравоходу в контексті Римських критеріїв IV перегляду // Укр. мед. часопис. – 2019. – Т. 1 – V/VI, №3 (131). – С. 1-4.