

ПРЕПАРАТИ ПРОТИГРИБКОВОЇ ДІЇ В УКРАЇНІ

Левачкова Ю.В., Чушенко В.М., Скитер С.М.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

chushenkov@rambler.ru

Частота захворювання вагінальним кандидозом у світі збільшилася і становить 40 % в структурі жіночої інфекційної патології статевих шляхів. У багатьох країнах світу зростання запальних захворювань є наслідком міграції населення, урбанізації, зміни статевої поведінки. Вагінальний кандидоз може призвести до ускладнень вагітності та пологів, патології жіночих статевих органів та зниження якості життя. Послідовне вирішення цієї проблеми буде сприяти поліпшенню репродуктивного здоров'я та якості життя жінок.

Вагінальний кандидоз – це запалення слизової піхви, яке викликане мікроскопічними дріжджоподібними грибками роду Кандида. До теперішнього часу причини виникнення кандидозу точно не встановлені. При лікуванні вагінального кандидозу місцеве переважає над системним лікуванням через безпосередній вплив та створення оптимальної концентрації препарату у місці запалення та і менший ризик селекції резистентних штамів.

Нами проведений аналіз асортименту антибактеріальних та антисептичних вагінальних лікарських форм (ЛФ) промислового виробництва на фармацевтичному ринку України. На песарії припадає 45,2 % вагінальних форм, на вагінальні таблетки – 34,2 %, на вагінальні креми - 9,6 %, на вагінальні капсули, розчини та гелі – близько 11 %. Аналіз асортименту ЛФ з флуконазолом на фармацевтичному ринку показав, що песарії з флуконазолом взагалі відсутні на ринку України і присутні лише таблетки, вкриті оболонкою.

Аналіз екстемпоральної рецептури аптеки № 9, м. Харків та «Аптеки медичної академії», м. Кривий Ріг показав, що для лікування вагінального кандидозу зустрічаються наступні субстанції: бензилпеніциліну натрієва сіль, стрептоцид, калія перманганат, метиленовий синій.

Таким чином, проведені дослідження показали необхідність створення лікарського засобу з флуконазолом у формі песаріїв.