

## РЕЗУЛЬТАТИ ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗУ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХОЛЕЦИСТИТ

О. В. Ткачова, Т. Т. Фунг Нгуєн

*Кафедра фармакоекономіки*

*Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна*

**tkachevaov@gmail.com**

**Вступ.** Холецистит є одним з найпоширеніших захворювань шлунково-кишкового тракту. Щорічно у світі реєструється близько 20 млн. випадків захворювань на різні форми холециститу та проводиться близько 2,5 млн. холецистоектомій. Метою роботи було дослідження споживання та раціональності призначення лікарських засобів (ЛЗ), що застосовували для лікування холециститу за даними частотного аналізу в ЗОЗ м. Харкова.

**Матеріали та методи дослідження.** Ретроспективний аналіз проведено за даними 120 історій хвороб пацієнтів з холециститом віком від 18 до 85 років, що проходили лікування в гастроентерологічному відділенні лікарні м. Харкова протягом 2013 року.

**Результати дослідження.** Для фармакотерапії холециститу у 120 хворих усього було призначено 138 ЛЗ із 25 фармакотерапевтичних груп. Згідно з отриманими результатами частіше призначались гепатотропні, спазмолітичні та противиразкові ЛЗ. Лідерами за кількістю лікарських призначень в ЗОЗ стали: тіотриазолін (88 призначень) та спазмобрю (81 призначення), що використовувались для терапії основного захворювання згідно з клінічним протоколом фармакотерапії холециститу. В даному ЗОЗ лікарі віддавали перевагу в рівній мірі як імпортом, так і вітчизняним ЛЗ.

**Висновок.** В цілому, призначення ЛЗ досліджуваним пацієнтам з холециститом можна вважати раціональними та доцільними. Результати дослідження служитимуть підґрунтям для подальшого дослідження питань щодо проведення раціональної фармакотерапії пацієнтів з холециститом в даному відділенні ЗОЗ м. Харкова.