тов для лечения ХОБЛ может указывать на рост количества больных с хронической обструктивной болезнью легких.

ТЕРАПИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА: ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ МИРОВОГО РЫНКА ИНСУЛИНОВ

О. Н. Кириченко[1], А. А. Кириченко[2], Тауил Си Мохамед[1]

Кафедра фармакоэкономики[1]

Кафедра фармакотерапии[2]

Национальный фармацевтический университет, г. Харков, Украина

feknfau@ukr.net

Введение. Стабилизация гликемии и поддержание ее целевых значений на настоящий момент осуществляется инсулинами животного происхождения (ИЖП), человеческими генно-инженерными инсулинами (ЧИ) и обладающими определенными преимуществами перед ними дорогостоящими высокотехнологичными аналогами инсулина человека (АИ). При сопоставимом контроле уровня HbA1c основные приоритеты АИ по сравнению с ЧИ связывают с более низкой частотой гипогликемических состояний, повышением приверженности к лечению и улучшением качества жизни больных сахарным диабетом.

Методы исследования. Библиографический, аналитический.

Результаты исследования. Структура потребления мирового рынка инсулинов неоднородна и характеризуется 3 направлениями. Для стран с высоким уровнем доходов АИ составляют 2/3 от всех потребляемых инсулинов, препараты ЧИ – 1/3. На долю препаратов ЧИ в странах со средним уровнем доходов приходится 2/3 от всех потребляемых инсулинов. Доля ЧИ в структуре потребления в странах с низким уровнем доходов значительна - более 90% от всех используемых инсулинов. ИЖП по данным 2009 г. применялись менее чем в 25% стран мира в незначительном количестве. Эксперты Международного фонда инсулина (IIF) для стран с ограниченными ресурсами здравоохранения при качественном мониторинге гликемического контроля считают вполне обоснованным и допустимым преобладание в структуре потребления ЧИ.

Выводы. Считается целесообразным в странах со сложной экономической ситуацией использовать ограниченные ресурсы для обеспечения всех нуждающихся человеческими генно-инженерными инсулинами и на проведение мероприятий, повышающих отдачу от их применения (на обучающие программы больных СД 2 типа, на приобретение средств самоконтроля, тест-полосок, мониторинг гликемического контроля).

ДАННЫЕ РЕАЛЬНОГО МИРА ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ЛЕЧЕНИЮ HR^+, $HER2^-$ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОК В ПОСТМЕНОПАУЗЕ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКОВСКОЙ МОДЕЛИ ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОК

Л. С. Краснова, П. А. Воробьев, М. А. Холовня

Кафедра гематологии и гериатрии

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия

aelita8@yandex.ru

Введение. В России рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости и смертности женского населения. Современные лечебные подходы распространенного рака молочной железы (рРМЖ) позволяют достичь клинически значимого регресса симптоматики, продления жизни и улучшения её качества. Целью исследования являлось проведение клинико-эпидемиологического анализа ведения постменопаузальных пациенток с гормонозависимым (HR^+), $HER2^-$ рРМЖ в России.

Методы исследования. Опрос экспертов из разных регионов России. Опросник включал следующие вопросы: доля пациенток с различными видами РМЖ; лекарственные средства и режимы их назначения в качестве 1-ой, 2-ой и 3-й линий терапии пациенток в постменопаузе HR^+, $HER2^-$ рРМЖ; частота госпитализаций в год; лабораторные, инструментальные методы исследования, консультации специалистов, нежелательные явления при применении препаратов в ходе лечения пациенток и режимы их лекарственной коррекции.