ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ В УКРАИНЕ

Л. В. Яковлева, А. В. Передерий

Кафедра фармакоэкономики

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина

feknfau@ukr.net

Введение. Язвенная болезнь (ЯБ) желудка и двенадцатиперстной кишки – часто встречающееся заболевание, которое поражает 10% взрослого населения в мире. По данным Центра медицинской статистики Украины заболеваемость ЯБ за последние 10 лет возросла на 38,4 %. Ингибиторы протонной помпы (ИПП) – эталон лечения кислотозависимых заболеваний. Они наиболее эффективно снижают продукцию соляной кислоты, что является обязательным условием для эрадикации Helicobacter pylori с помощью антибиотиков. Целью нашего исследования было изучение динамики потребления группы ИПП в Украине в течение последних трёх лет (2011 – 2013 гг.).

Материалы и методы исследований. Для определения объёма потребления ИПП использовали ATC/DDD – методологию и данные об объёмах реализации ЛП системы «Лекарственные средства» компании Морион за 2011-2013 годы.

Результаты исследований. На фармацевтическом рынке Украины представлено 5 МНН препаратов группы ИПП, на основании последних в данный момент 107 ТН. По объёмам потребления в показателе DDDs/1000/день состоянием на 01.01.2014 г ИПП можно расположить в следующий ряд: омепразол (6,33) > пантопразол (1,2) > рабепразол (0,42) > ланзопразол (0,12) > эзомепразол (0,021). Также анализ динамики потребления ИПП показал, что в течение последних трёх лет общее потребление ИПП в Украине выросло в 1,35 раза и составило в единицах DDDs/1000/день соответственно 5,99 (2011 г); 7,16 (2012 г); 8,06 (2013 г.).

Выводы. Анализ потребления препаратов ИПП показал, что за последние три года, объём потребления в DDDs/1000/день вырос в 1,35 раза. Это может говорить о том, что растёт и заболеваемость язвенной болезнью желудка.