

**ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ  
ПРЕПАРАТІВ ІТРАКОНАЗОЛУ  
ПРИ ЛІКУВАННІ МІКОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ  
У ЖІНОК З ГІНЕКОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ**

*Ю.В. ТИМЧЕНКО*

Національний фармацевтичний університет, м.Харків, Україна

*Мета роботи:* визначення етіопатогенетичного обґрунтування та оцінка ефективності лікування вагінальних кольпітів грибкової етіології препаратами ітраконазолу.

*Матеріали і методи:* проведення неінтервенційного вибіркового дослідження 45 жінок ( віком від 19 до 54 років) з хронічними рецидивуючими грибковими кольпітами та вульвовагінітами, які були розділені на дві паралельні групи: I група з 23 жінок отримувала стандартну терапію, яка включала місцеве застосування препаратів міконазолу та флуконазолу. II група з 22 жінок отримувала ітракон по 200мг 1 раз на добу протягом 7 днів. При оцінці фіксували параметри клінічних та лабораторних досліджень.

*Результати:* Хронічні вульвовагінальні кандидози (ХВВК)- це «хвороба цивілізації», що охоплює до 75% сучасних жінок, які мали вагінальний кандидоз. Збудником ХВВК у 85% випадків є мікст-кандидозна інфекція, резистентна до широко застосовуваних антимікотичних засобів. Визначено фармакодинамічний ефект ітраконазолу, похідного тріазолу, синтетичного протигрибкового засобу. Механізм дії ітраконазолу пов'язаний з інгібуванням синтезу ергостеролу – важливого компоненту кліткової мембрани грибів. В II групі значно вищою (до 84% -18 пацієнток) була частка одужання та відсутності рецидивів.

*Висновки:* Встановлено високу ефективність дії ітраконазолу при лікуванні хронічних вульвовагінальних кандидозів. Ітраконазол забезпечує ерадикацію усіх видів патогенних кандид, що надає можливість емпіричного лікування ХВВК без попереднього визначення підвиду грибів.