

# ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ МОНОКОМПОНЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ ТА ЇХ КОМБІНАЦІЙ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ

*В.Ю. АДОМКИНА*

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

*Мета роботи:* Артеріальна гіпертензія (АГ) – найбільш поширене захворювання у світі, що значною мірою визначає високу смертність осіб працездатного віку. Рациональна фармакотерапія АГ потребує довічного застосування антигіпертензивних препаратів (АГП) в дозах необхідних для досягнення цільового рівня АТ. З огляду на це, обсяг споживання АГП відбиває закономірності і тенденції лікування АГ. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ) найбільш широко використовуються в терапії АГ. Мета роботи - визначити обсяг та провести порівняльний аналіз споживання (за показником DDDs/1000/d) ІАПФ в Україні.

*Матеріали та методи:* Дослідження динаміки споживання ІАПФ проводили за АТС/DDD-методологією, використовуючи дані про обсяги реалізації ЛП довідково-пошукової системи «Лікарські засоби» компанії Моріон протягом 2008–2011 років.

*Результати дослідження:* Аналіз динаміки споживання ІАПФ за досліджуванні роки свідчить, що протягом 4 років лідерами за обсягом споживання (за показником DDDs/1000/d) є: монокомпонентні препарати еналаприла (10,58-12,47) та лізіноприла (3,28-3,93). У структурі споживання каптоприла переважають комбіновані препарати (5,25-7,14 DDDs/1000/d).

*Висновки:* Отримані результати свідчать, що серед ІАПФ безумовними лідерами споживання за показником DDDs/1000/d на фармацевтичному ринку України є: еналаприл, каптоприл, лізіноприл. Ці препарати представлені найбільшою кількістю генериків вітчизняного виробництва, що обумовлює їх високу цінову доступність для пацієнта.