

ДИНАМІКА СПОЖИВАННЯ АНТИГІСТАМІННИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

Передерій А.В., Яковлева Л.В.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

ana2971@i.ua

За останні роки в усьому світі спостерігається тенденція до суттєвого зростання частоти алергічної патології. Різні прояви алергії, згідно з даними ВООЗ, реєструються у 7-30% випадків всіх захворювань. Існує прогноз, що до середини ХХІ століття дана патологія стане надзвичайно поширеною у світі.

Метою даного дослідження було вивчення динаміки споживання антигістамінних засобів (АГЗ) в Україні протягом останніх трьох років (2012 - 2014 рр.).

Для визначення обсягу споживання АГЗ використовували АТС/DDD - методологію і дані про обсяги реалізації ЛП пошукової системи «Лікарські засоби» компанії Моріон.

На фармацевтичному ринку України представлено 14 МНН АГЗ, на підставі останніх в даний момент 164 ТН. За обсягами споживання в показнику DDDs/1000/d станом на кінець 2014 року препаратами-лідерами серед АГЗ стали: Лоратадин (2,62)> Левоцетиризин (1,91)> Цетиризин (1,78)> Мебгідролін (1,38). Споживання АГЗ протягом аналізованих трьох років характеризувалося незначним зростанням. В одиницях DDDs/1000/d це виглядає так: 9,08 (2012 р.), 9,9 (2013 р.) і 9,61 (2014 р.). Аналіз обсягів споживання показав, що найбільш споживаний препарат - Лоратадин, його показник DDDs/1000/d – 2,62, що пояснюється великою кількістю генеричних препаратів та високим рівнем доказовості.

На українському фармацевтичному ринку АГЗ представлено 14 МНН АГЗ, на підставі останніх в даний момент 164 ТН, що дозволяє споживачеві вибрати ЛП, виходячи зі своїх фінансових можливостей.