

**АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДИСПЕПСІЇ У ДІТЕЙ
НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ**

Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, І. В. Мещерякова

Кафедра фармакоекономіки

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

gerasimowa.o@yandex.ua

Вступ. Функціональна диспепсія – це симптомокомплекс, що включає біль або відчуття дискомфорту в надчеревній ділянці, тяжкість і відчуття переповнення в епігастрії після їжі, здуття живота, нудоту, блювання, відрижку, печію та інші симптоми, при яких, незважаючи на ретельне обстеження, не вдається виявити органічне захворювання. Функціональна диспепсія широко розповсюджена серед дитячого населення у всьому світі, характеризується зниженням якості життя хворих, вимагає великих витрат на медичне обслуговування та лікування. Вона не представляє безпосередньої загрози для життя пацієнта, але виникаючи в дитячому віці, є основою для формування органічної патології органів травлення дорослих.

Лікування хворих на функціональну диспепсію повинно бути диференційованим з урахуванням клінічного варіанту перебігу захворювання та комплексним і включати дієтичні рекомендації, корекцію режиму та способу життя, медикаментозну терапію. Згідно з уніфікованим клінічним протоколом медичної допомоги дітям із функціональною диспепсією (Наказ МОЗ України № 59 від 29.01.2013 р.) для лікування захворювання використовуються наступні лікарські препарати: антациди, інгібітори протонної помпи (омепразол, пантопразол, рабепразол, езомепразол), блокатори H₂-рецепторів гістаміну (ранітидин, фамотидин), стимулятори перистальтики, альгінати, спазмолітики (папаверин, дротаверин, пінаверію бромід), репаранти (препарати з кореня солодки, супліддя ольхи), в'язучий засіб плантаглюцид, препарати, що містять пепсин.

Мета даної роботи – провести аналіз асортименту препаратів для лікування функціональної диспепсії у дітей на фармацевтичному ринку України у 2015 році.

Методи досліджень. Для досягнення поставленої мети дослідження було використано структурний, логічний, порівняльний та маркетинговий методи. Асортимент препаратів для лікування функціональної диспепсії у дітей в Україні визначали, використовуючи систему дослідження ринку «Фармстандарт» компанії «Моріон» (за станом на серпень 2015 року).

Результати досліджень. У 2015 році лікарські препарати для лікування функціональної диспепсії у дітей були представлені в Україні 227 торговими найменуваннями (ТН), які відповідали 25 міжнародним непатентованим назвам. Більшість з них – представники інгібіторів протонної помпи пантопразолу та омепразолу (відповідно, 38 та 20 ТН), стимулятора перистальтики домперидону (18 ТН), спазмолітика дротаверіну (21 ТН).

Частка препаратів вітчизняного виробництва становить 34 % (77 препаратів). Кількість пропозицій імпортованих лікарських засобів на ринку перевищує пропозиції вітчизняних компаній-виробників майже в 2 рази.

Препарати для лікування функціональної диспепсії у дітей представлені в різних формах випуску: таблетки та капсули, гелі для перорального застосування, суспензії, розчини для ін'єкцій, порошки для приготування суспензій, гранули, краплі оральні. Найбільш поширеними в товарному асортименті є таблетки та капсули - 78 % (176 препаратів).

Висновки. Препарати для лікування функціональної диспепсії у дітей представлені в Україні в широкому асортименті, що надає можливість лікарю обрати лікарський препарат з урахуванням його ефективності та безпечності, а також індивідуальних особливостей пацієнта, ступеня тяжкості захворювання та вартості препарату.