

РЕЗУЛЬТАТИ VEN-АНАЛІЗУ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ДІТЕЙ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ДИСПЕПСІЄЮ

О.О. Герасимова, І.В. Мещерякова, Є.В. Овсієнко

Кафедра фармакоелекономіки

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

ph-econom@nuph.edu.ua

Вступ. Для забезпечення раціонального використання лікарських засобів (ЛЗ) доцільним є проведення клініко-економічного аналізу фармакотерапії захворювань в медичній практиці. Мета даної роботи – оцінка необхідності призначень ЛЗ дітям з функціональною диспепсією (ФД) в клініці м. Харкова

Методи досліджень. За допомогою «формального» VEN-аналізу визначали наявність ЛЗ в українських клінічних протоколах медичної допомоги дітям з ФД та з супутніми захворюваннями (дискінезія жовчовивідних шляхів, синдром подразненого кишечника, бронхіальна астма, пієлонефрит, цистит), що були зареєстровані у досліджуваних пацієнтів. При наявності ЛЗ в зазначених документах він отримував індекс V, при відсутності в них - індекс N. Період дослідження – 2015 рік.

Результати досліджень. Аналіз 86 історій хвороб пацієнтів з ФД віком від 7 до 13 років визначив 39 ЛЗ (34 міжнародні непатентовані назви (МНН)) з 23 фармакологічних груп, що були використані для фармакотерапії. За результатами VEN-аналізу значна кількість ЛЗ (88,24 %) входила в групу «V». В клінічних протоколах були відсутні спазмолітик мебеверин та МНН гепатотропного препарату «Галстена», гастропротектора «Вікалін», представника групи «Інші засоби, що впливають на нервову систему» – «Гліцин».

Висновки. Основні напрямки проведення фармакотерапії дітей з ФД в даній клініці м. Харкова відповідали клінічним протоколам надання медичної допомоги при ФД та супутніх захворюваннях, зареєстрованих у досліджуваних пацієнтів. Але призначення 11,76 % ЛЗ з індексом N вказує на необхідність подальшої корекції призначень ЛЗ відповідно до клінічних протоколів.