

ВИВЧЕННЯ СПОЖИВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ ЗА 2016- 2018 РОКИ

А. О. Манмарьова, О. Г. Бердник

Кафедра фармакоелекономіки

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

feknfau@ukr.net

Вступ. Збудниками гепатитів А, В, С є облігатні гепатотропні віруси. Вірусні гепатити характеризуються схожістю симптоматики, проте різні за етіологією, патогенезом, тяжкістю перебігу, наслідками і відповідно різними підходами до етіотропної терапії. Медико-соціальне значення захворюваності на хронічні гепатити визначається їх високою поширеністю, формуванням тяжких ускладнень, таких як цироз печінки та гепатоцелюлярна карцинома, що призводять до інвалідизації та зростання летальності хворих.

Мета роботи. Визначити об'єми споживання лікарських засобів, з призначених для лікування вірусних гепатитів на українському фармацевтичному ринку з використанням АТC/DDD методології в показниках DDDs/1000 жителів/день або DID протягом 2016-2018 років.

Методи дослідження. Для проведення дослідження була використана рекомендована ВООЗ АТC/DDD-методологія, яка застосовується для моніторингу об'ємів споживання певних груп ЛЗ у DDDs /1000 жителів/день.

Результати досліджень. Згідно з проведеним аналізом споживання серед 5 МНН, зареєстрованих на фармацевтичному ринку, найбільш споживаними протягом досліджуваного періоду були препарати софосбувіру та тенофовіру. Першу позицію займає МНН тенофовір представлений у 2016-2018 рр. 1 торговим найменуванням (ТН) «Віреад». Показники споживання цього препарату протягом 2016-2018 рр. становили 0,0031-0,010 DID. Другу позицію займає МНН софосбувір, представлений 2 ТН - «Гратеціано» і «Совалді». Показники споживання для софосбувіру становили 0,00032-0,000021 DID. Загальне споживання протівірусних препаратів склало: за 2016 рік – 0,0031 DID, за 2017 рік – 0,0046 DID, за 2018 рік – 0,0096 DID.

Висновок. Згідно з отриманими результатами для лікування вірусних гепатитів А, В, С найбільш споживаними в Україні протягом 2016-2018 років є софосбувір (0,00032-0,000021 DID) і тенофовір (0,0031-0,010 DID). Софосбувір застосовується для лікування хронічного гепатиту С, а Тенофовір призначений для лікування хронічного гепатиту В. Загальне споживання протівірусних препаратів було дуже низьким і становило від 0,0031 DID (у 2016 р.) до 0,0096 DID (у 2018 р.).