

результатом у 25,3% користувачів молодіжного віку. Загальна чисельність респондентів - жінок, відповіді яких було признано повними, склала 320 осіб.

Результати опитування показали, що 85% респондентів у якості основного фактору ризику РЗ позиціонують поведінковий фактор, який визначає як фертильність, так й репродуктивність жінки. Сьогоднішня ситуація продиктувала, що майже 70% жінок вважають за безвідповідальне планувати репродукції взагалі, а 65% з них згодні зачати дитину та народжувати тільки за умов мирного часу та державної охорони РЗ, яке має забезпечуватися протягом усього періоду дітородного віку жінки (88,2%). У середньому 77,5% жінок вважають низькою поінформованість відносно шляхетного (56,6%); етичного (89,4%) та відповідального (86,5%) відношення до власного РЗ.

Вищезначене дає нам право зробити висновок про те наскільки важливо вивчення факторів впливу на репродуктивне здоров'я як соціального феномена, який виступає невід'ємною складовою нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства.

ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЇ

Подколзіна М.В., Тетерич Н.В.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

economica@ukr.net

Лікування алергії — питання, актуальне для 30% українців, і спеціалісти ВООЗ вважають XXI століття століттям алергії. Пов'язано це з тим, що суттєво погіршилася екологічна ситуація й знизилася якість продуктів харчування. Причиною виникнення алергії може бути навіть психосоматика. Усе це стало причиною ослаблення імунної системи.

Найпоширеніший метод лікування алергії — це антигістамінні препарати, найчастіше у формі таблеток. Антигістамінні препарати блокують

вивільнення гістаміну, або блокують рецептори гістаміну. Таким чином, алерген потрапляє в організм, але гістамін не вивільняється та алергічна реакція (свербіж, висип, задуха) не розвивається. До небезпечних проявів алергії належать алергічна астма, бронхіт і набряк Квінке.

Для дослідження доступності ЛЗ антигістамінної дії та лікарських засобів інших груп, які застосовують для лікування алергії було обрано асортимент лікарських засобів в мережевій аптеці м. Харків.

За результатами дослідження в асортименті аптеки виявлено 50 препаратів для дорослих та 16 препаратів у дозуванні для дітей.

Аналіз асортименту досліджуваної групи ЛЗ за країною виробником показав, що серед лікарських засобів у дитячому дозуванні 75% займають українські ЛЗ, серед лікарських засобів для дорослих доля українських препаратів склала 20%.

В результаті аналізу асортименту ЛЗ за фармгрупою встановлено, що антигістамінні засоби склали 76% разом. З них найбільша група це антигістамінні ЛЗ II покоління – 42%. Кортикостероїди склали 20% асортименту, проти астматичні засоби та анксиолітики склали 2% та 1% відповідно. Аналіз антигістамінних лікарських засобів за МНН показав велике різноманіття діючих речовин: препарати Дезлоратадину склали найбільшу долю – 23%, Левоцетиризину – 18%. ЛЗ з МНН Цетиризин склали 8%, Диметинден та Кетотифен – по 6% асортименту. Препарати з МНН Біластин, Ебастин, Клемастин, Мебгідролін, Рупатадин, Секвіфенадин, Фексофенадин, Фексофенадин, Хіфенадин, Хлоропірамін, Ципрогептадин склали частки менші 2% асортименту.

Аналіз антигістамінних лікарських засобів за підгрупою (дитячі/дорослі) показав, що серед дитячих препаратів найбільше антигістамінних засобів II покоління та III покоління – 40% та 33%. А серед дорослих ЛЗ цієї групи 62% склали засоби II покоління та 23% засоби I покоління.




Рис. Аналіз асортименту антигістамінних ЛЗ дитячі/дорослі (дитячі-внутрішнє коло, для дорослих – зовнішнє коло)

Отже, в асортименті аптеки присутні антигістамінні ЛЗ трьох поколінь, 17 МНН, дитячі ЛЗ переважно українського виробництва – 75%.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ ЩОДО ВИРОБНИКІВ ТА СКЛАДУ ДИТЯЧИХ МОЛОЧНИХ СУМІШЕЙ

Подколзіна М.В., Тищенко А.М.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

economica@nuph.edu.ua

Штучне вигодовування – це вигодовування дитини від народження до одного року сумішами подібними до грудного молока. Вигодовування молочними сумішами є нормою, а іноді і необхідністю. Показаннями є відсутність продукції молока у матері, відсутність донорського грудного молока. З огляду на наведені дані метою дослідження стало вивчення складу дитячих молочних сумішей від провідних виробників. За результатами пошуку літературних даних встановлено, що в Україні, близько 20% матерів годують дітей до 6 місяців лише грудним молоком, інші 80% використовують