

*Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського
Національний фармацевтичний університет*

**ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
ЧАСОПИС**

Науково-практичний журнал

4(24)/2012

*Ternopil State Medical University
named after I.Ya. Horbachevsky
National Pharmaceutical University*

**PHARMACEUTICAL
REVIEW**
Scientific-practical journal

- ◆ Синтез біологічно активних сполук
- ◆ Фітохімічні дослідження
- ◆ Фармацевтична технологія, біофармація, гомеопатія
- ◆ Аналіз лікарських препаратів
- ◆ Інформаційні та інноваційні технології в фармації
- ◆ Фармацевтичний менеджмент, маркетинг та логістика
- ◆ Організація роботи аптечних підприємств
- ◆ Економіка аптечних і фармацевтичних підприємств
- ◆ Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин
- ◆ Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських засобів
- ◆ Фармакоекономіка
- ◆ Нутриціологія
- ◆ Фармацевтичне законодавство
- ◆ Ветеринарна фармація
- ◆ Фармацевтична освіта
- ◆ Історія фармації
- ◆ Хроніка подій
- ◆ Обмін досвідом

- ◆ Synthesis of biologically active compounds
- ◆ Phytochemical researches
- ◆ Pharmaceutical technology, biopharmacy, homeopathy
- ◆ Analysis of drugs
- ◆ Informational and innovative technologies in pharmacy
- ◆ Pharmaceutical management, marketing and logistics
- ◆ Organization of pharmaceutical structures' work
- ◆ Economics of pharmaceutical structures
- ◆ Pharmacological researches of biologically active substances
- ◆ Pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs
- ◆ Pharmacoeconomics
- ◆ Nutritiology
- ◆ Pharmaceutical legislation
- ◆ Veterinary pharmacy
- ◆ Pharmaceutical education
- ◆ History of pharmacy
- ◆ Chronics of events
- ◆ Exchange of experience

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЧАСОПИС
PHARMACEUTICAL REVIEW
Науково-практичний журнал
Scientific-practical journal

Заснований у 2006 році
 Founded in 2006

Свідоцтво про державну реєстрацію
 друкованого засобу масової інформації
 Зареєстровано Міністерством юстиції України
 Серія КВ №13308-2192 П
*Certificate of State Registration of printed mass media
 Registered by Ministry of Juridice of Ukraine
 Series KB №13308-2192 P*
 Журнал "Фармацевтичний часопис" затверджений
 постановою Президії ВАК України від 01.07.2010р.
№1-05 / 5 (фармацевтичні науки)
 Засновники Тернопільський державний медичний
 університет імені І. Я. Горбачевського,
*Founders Ternopil State Medical University named
 after I. Ya. Horbachevsky, National Pharmaceutical
 University, Kharkiv*

Передплатний індекс: 98601
Subscription index: 98601

Адреса редакції:
 Журнал «Фармацевтичний часопис»
 Майдан Волі, 1 м. Тернопіль, 46001 УКРАЇНА

Editorial office address:
 Journal «Pharmaceutical review»
 Maidan Voli, 1 Ternopil, 46001 UKRAINE

Тел. (0352) 52-72-22, 52-05-18
 Факс (0352) 52-80-09
<http://www.tdmu.edu.te.ua/farmchas/index.php>

Рекомендовано до видання вчену радою Тернопільського
 державного медичного університету імені І.Я. Горба-
 чевського (протокол № 5 від 28 листопада 2012 р.)
 та вчену радою Національного фармацевтичного
 університету (протокол № 4 від 27 листопада 2012 р.).

Відповіальність за зміст, достовірність і орфографію
 рекламних матеріалів несе рекламодавець. Редакція не
 несе відповіальності за достовірність фактів, власних
 імен та іншої інформації, використаної в публікаціях.
 При передруці або відтворенні повністю чи частково
 матеріалів журналу «Фармацевтичний часопис»
 посилання на журнал обов'язкове.

©Науково-практичний журнал «Фармацевтичний часопис»,
 2012
 ©Scientific-practical journal: «Pharmaceutical review», 2012

СИНТЕЗ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ R-БЕНЗОЛОКСАМІДОЕТАНОВИХ КИСЛОТ

© Н. І. Банна¹, О. С. Криськів¹, І. П. Баний¹, В. М. Савченко²

¹Національний фармацевтичний університет, Харків

²Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Резюме: з метою пошуку речовин з діуретичною, протизапальною та анальгетичною активністю здійснено синтез нової групи хімічних сполук – R-бензолоксамідоетанових кислот. Структуру синтезованих сполук доведено методами елементного аналізу, УФ-, ІЧ- та ПМР-спектроскопії. Фармакологічні дослідження показали, що більшість сполук виявляє діуретичну, протизапальну та анальгетичну активність при низькій токсичності.

Ключові слова: R-бензолоксамідоетанові кислоти, фармакологічна активність, токсичність.

Вступ. Арсенал лікарських засобів, які використовують у сучасній медицині, налічує велику кількість ефективних препаратів, але усі вони певною мірою виявляють небажані побічні ефекти, що обмежує їх застосування [10, 11]. Тому цілеспрямований пошук високоефективних та безпечних препаратів є актуальною проблемою сучасної медицини.

В останні роки хіміки та фармакологи проводять інтенсивний пошук біологічно активних речовин серед похідних оксамоїламінокислот. У вказаних рядах сполук знайдено речовини з різноманітними видами фармакологічної активності [1 – 3, 6 – 8].

Мета даної роботи – синтез нових груп сполук похідних оксамідоетанової кислоти, вивчення їх фармакологічної активності та її залежності від будови нових сполук.

Методи дослідження. УФ-спектри синтезованих сполук зареєстровано на приладі SPECORD 200 (фірма «Analytikjena») в етанолі. ІЧ-спектри вимірюють на спектрофотометрі TENSOR 27 (фірма «Bruker») у таблетках калію броміду (концентрація речовини – 0,5%). Спектри ПМР записано у DMSO-D₆ на спектрометрі Varian Mercury VX-200, внутрішній стандарт – ТМС.

3-Хлоробензолоксамідоетанова кислота (ІІІп, табл. 1).

Таблиця 1. Характеристики R-бензолоксамідоетанових кислот

Спол.	R	Вихід, %	Т. пл.*, °C	Знайдено, %			Брутто-формула	Вираховано, %			R _f **
				C	H	N		C	H	N	
ІІІа	2-ОН	67	176 – 178	51,36	4,34	12,02	C ₁₀ H ₁₀ N ₂ O ₅	51,28	4,30	11,96	0,71
б	3-ОН	71	164 – 165	51,42	4,35	12,06	C ₁₀ H ₁₀ N ₂ O ₅	51,28	4,30	11,96	0,58
в	4-ОН	81	182 – 184	51,44	4,34	12,08	C ₁₀ H ₁₀ N ₂ O ₅	51,28	4,30	11,96	0,62
г	2-CH ₃	80	202 – 204	56,10	5,16	11,94	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₄	55,93	5,12	11,86	0,48
д	4-CH ₃	77	196 – 198	55,98	5,17	11,98	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₄	55,93	5,12	11,86	0,66
е	2-OCH ₃	68	186 – 188	52,46	4,85	11,16	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₅	52,38	4,79	11,10	0,56
ж	3-OCH ₃	72	191 – 193	52,50	4,84	11,14	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₅	52,38	4,79	11,10	0,45
з	4-OCH ₃	77	211 – 213	52,47	4,86	11,13	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₅	52,38	4,79	11,10	0,64
і	3-COOH	73	167 – 168	49,76	3,85	10,63	C ₁₁ H ₁₀ N ₂ O ₆	49,63	3,79	10,52	0,70
к	4-COOH	79	178 – 180	49,78	3,81	10,67	C ₁₁ H ₁₀ N ₂ O ₆	49,63	3,79	10,52	0,55
л	3-COOCH ₂ H ₅	79	154 – 155	53,18	4,82	9,58	C ₁₃ H ₁₄ N ₂ O ₆	53,06	4,79	9,52	0,67
м	3-NO ₂	84	156 – 167	45,12	3,41	15,80	C ₁₀ H ₉ N ₃ O ₆	44,95	3,39	15,73	0,43
н	4-NO ₂	76	166 – 167	45,14	3,44	15,82	C ₁₀ H ₉ N ₃ O ₆	44,95	3,39	15,73	0,51
о	2-Cl	77	171 – 172	46,94	3,59	11,02	C ₁₀ H ₉ ClN ₂ O ₄	46,80	3,53	10,91	0,65
п	3-Cl	84	180 – 182	46,89	3,58	11,00	C ₁₀ H ₉ ClN ₂ O ₄	46,80	3,53	10,91	0,45

Примітки: * – кристалізують з пропанолу-2; ** – константи R_f визначені методом ТШХ у системі розчинників: етанол-гексан-хлороформ (1:1:1) на пластинах «Silufol UV-254», проявлення парами йоду.

До розчину 0,56 г (0,01 моль) калію гідроксигиду в 5 мл метанолу додають 0,75 г (0,01 моль) аміноетанової кислоти. Одержані розчини додають до розчину 2,27 г (0,01 моль) етилового

естеру 3-хлороксанілової кислоти у 10 мл діоксану та залишають стояти до зникнення лужного середовища. Осад, що випав, відфільтровують, розчиняють у 10 мл води. Розчин підкислюють до pH 3. Осад, що випав, відфільтровують, висушать і кристалізують з пропанолу-2. Т. пл. 180 – 182 °C. Вихід – 2,14 г.

Аналогічно одержують сполуки IIIa-o.

Гостру токсичність синтезованих сполук вивчали при їх внутрішньошлунковому введенні білим мишам [9]. Середні смертельні дози (LD_{50}) визначали методом Кьюрбера [5].

Діуретичну активність вивчено на білих щурах самцях лінії Вістар масою 210 – 240 г [9]. Результати досліджень наведено в таблиці 3.


Протизапальну активність нових сполук вивчали на моделі гістамінового набряку [9]. Досліди проводили на білих безпородних щурах обох статей масою 210 – 220 г. Одержані результати наведено у таблиці 3.

Аналігетичну активність досліджували на моделі «оцтових корчів» у дослідах на білих щурах масою 180 – 220 г [9]. Одержані результати наведено у таблиці 3.

Уесь експериментальний матеріал оброблено методом варіаційної статистики з урахуванням критерію Стьюдента [4].

Результати й обговорення. Як реагенти для синтезу R-бензолоксамідоетанових кислот IIIa-p використано заміщені аніліни (I, схема).

Схема



При кип'ятінні заміщених анілінів (I) з діетилоксалатом синтезовані етилові естери заміщених оксанілових кислот (II). У результаті амідування естерів II аміноетановою кислотою у присутності калій гідроксиду утворюються калієві солі R-бензолоксамідоетанових кислот, при підкисленні яких одержано R-бензолоксамідоетанові кислоти (IIIa-p).

Сполуки IIIa-p (табл. 1) – безбарвні кристалічні речовини, легкорозчинні у водних лугах, а при нагріванні – у ДМФА, спирті, діоксані.

Будову сполук IIIa-p підтверджено даними елементного аналізу, УФ-, ІЧ- та ПМР-спектрів, індивідуальність – методом ТШХ (табл. 1, 2).

В УФ-спектрах найінтенсивнішим є поглинання основного структурного фрагмента молекули, що містить бензольний цикл. УФ-спектри синтезованих сполук мають одну смугу поглинання при значеннях λ 204 – 218 нм, ϵ 6730 – 9840 $\text{л} \times \text{см}^{-1} \times \text{моль}^{-1}$.

В ІЧ-спектрах сполук IIIa-p (табл. 2) виявлено смуги поглинання у ділянці 1715 – 1684 см^{-1} , які відповідають валентним коливанням карбонільної групи (І амідна смуга). Смуги поглинання у ділянці 1580 – 1538 см^{-1} належать до деформа-

ційних коливань NH-групи (ІІ амідна смуга), а при 3368 – 3320 см^{-1} та 3294 – 2996 см^{-1} – до валентних коливань NH-групи. Валентні коливання у ділянці 3178 – 2982 см^{-1} відповідають гідроксильній групі. Валентні коливання зв'язків C–Cl спостерігаються при 786 – 742 см^{-1} .

У ПМР-спектрах сполук IIIa-p (табл. 2) присутня група сигналів при 7,92 – 7,42 м.ч., яка відповідає протонам ароматичної системи. Сигнали метilenової групи спостерігаються при 3,87 – 3,76 м.ч. У слабкому полі з хімічним зсувом 10,12 – 8,64 м.ч. знаходяться сигнали NH-груп, а в більш слабкому полі з хімічним зсувом 12,02 – 11,80 м.ч. виявляються протони карбоксильної групи у вигляді широкого синглету.

Результати проведених досліджень показали, що гостра токсичність вивчених сполук перебуває у діапазоні 1976 – 2740 мг/кг (табл. 3). Найменш токсичною виявилась 3-хлоробензолоксамідоетанова кислота IIIp, LD_{50} якої становить 2740 мг/кг. Найтоксичнішою виявилась сполука IIIj, яка містить у положенні 3 бензольного кільця метоксигрупу, LD_{50} її становить 1976 мг/кг.

Аналіз результатів вивчення діуретичної активності показав, що більшість синтезованих спо-

Таблиця 2. ІЧ- (см^{-1}) та ПМР-спектри (δ , м.ч.) R-бензолоксамідоетанових кислот

Спол.	ІЧ-спектр, см^{-1}	ПМР-спектр, δ , м.ч.					
		$\nu\text{C=O}$ (амід I)	Н аром.	NH (1Н, с)	-CH ₂ -	-OH (1Н, с)	Інші протони
IIIa	1685	7,46 (2Н, д), 7,88 (2Н, д)	9,88; 8,75	3,83 (2Н, д)	11,92		
б	1692	7,43 (2Н, д), 7,92 (2Н, д)	9,96; 8,76	3,78 (2Н, д)	12,00		
в	1687	7,47 (2Н, д), 7,86 (2Н, д)	9,92; 8,68	3,76 (2Н, д)	11,86		
г	1688	7,44 (2Н, д), 7,90 (2Н, д)	9,90; 8,72	3,82 (2Н, д)	11,80	2,60 (3Н, с, CH ₃)	
д	1692	7,45 (2Н, д), 7,92 (2Н, д)	9,86; 8,71	3,77 (2Н, д)	11,88	2,48 (3Н, с, CH ₃)	
е	1686	7,42 (2Н, д), 7,88 (2Н, д)	10,02; 9,16	3,84 (2Н, д)	12,02	3,72 (3Н, с, OCH ₃)	
ж	1690	7,48 (2Н, д), 7,86 (2Н, д)	9,87; 8,73	3,78 (2Н, д)	11,84	3,75 (3Н, с, OCH ₃)	
з	1682	7,45 (2Н, д), 7,92 (2Н, д)	9,94; 8,67	3,82 (2Н, д)	11,80	3,72 (3Н, с, OCH ₃)	
і	1685	7,47 (2Н, д), 7,88 (2Н, д)	9,86; 8,66	3,76 (2Н, д)	11,96		
к	1688	7,44 (2Н, д), 7,90 (2Н, д)	9,92; 8,64	3,85 (2Н, д)	11,85		
л	1695	7,46 (2Н, д), 7,87 (2Н, д)	9,87; 9,06	3,78 (2Н, д)	11,92	1,30 (3Н, т, CO ₂ CH ₂ CH ₃) 4,26 (2Н, к, CO ₂ CH ₂ CH ₃)	
м	1681	7,56 (2Н, д), 7,92 (2Н, д)	9,90; 8,88	3,82 (2Н, д)	11,88		
н	1687	7,62 (2Н, д), 7,88 (2Н, д)	9,86; 8,74	3,76 (2Н, д)	11,82		
о	1690	7,47 (2Н, д), 7,86 (2Н, д)	10,00; 9,02	3,84 (2Н, д)	11,96		
п	1684	7,42 (2Н, д), 7,84 (2Н, д)	9,92; 8,86	3,87 (2Н, д)	12,02		

Таблиця 3. Діуретична, протизапальна, анальгетична активність та гостра токсичність R-бензолоксамідоетанових кислот

Спол.	Активність				ЛД ₅₀ , мг/кг	
	діуретична, % у дозі 0,01 ЛД ₅₀		протизапальна, % у дозі 10 мг/кг	анальгетична, % у дозі 50 мг/кг		
	через 2 год	через 4 год				
IIIa	106,5	128,7	10,6	14,2	2146	
б	112,4	130,5	21,4	18,8	1994	
в	98,7	112,4	—	2,0	2135	
г	65,6	88,4	—	—	2615	
д	66,1	92,3	2,8	4,4	2268	
е	74,6	98,2	14,6	12,5	2046	
ж	68,8	84,5	19,7	14,6	1976	
з	102,6	123,3	21,2	23,7	2090	
і	161,4	169,2	—	—	2146	
к	170,2	181,4	16,8	14,4	2210	
л	126,5	134,2	41,5	38,8	2082	
м	76,2	84,5	17,8	14,2	2176	
н	82,6	93,4	14,6	17,7	2115	
о	67,6	79,2	28,7	22,9	2122	
п	76,6	96,1	52,6	49,1	2740	
Гіпотіазид	159,2	168,5			1175	
Фуросемід	321,4	403,8			1000	
Адіурекрин	55,4	57,9				
Аналгін			50,8	48,6	1197	
Диклофенак			56,2	52,5	360	

лук в умовах водного навантаження викликали збільшення видільної функції нирок у середньому на 12,4 – 81,4 % (табл. 3). Виражену діуретичну активність, яка перевищувала дію гіпотіазиду, показала сполука, що містить у положенні 4 бензольного циклу карбоксильну групу. Вказана сполука (IIIk) за 2 години збільшувала діурез

на 70,2%, а за 4 години – 81,4%. Сполука IIIi показала активність на рівні гіпотіазиду. Вказана сполука за 2 год збільшувала діурез на 70,2, а за 4 год – на 81,4. Заміна вказаних замісників у бензольному ядрі зменшує діуретичний ефект.

Аналіз результатів вивчення протизапальної активності свідчить, що більшість досліджених

сполук зменшувала розвиток експериментального набряку у середньому на 2,8 – 52,6 % (табл. 3). Найбільш виражений антиексудативний ефект виявлено у сполуки III_p, яка містить у положенні 3 бензольного ядра атом хлору. Вказані сполуки пригнічувала розвиток набряку на 52,6%, що дорівнює дії анальгіну та не досягає дії диклофенаку. Заміна вказаних радикалів на інші зменшує антиексудативний ефект. Сполуки III_b, III_g та III_i виявилися неактивними.

З таблиці 3 видно, що більшість вивчених сполук виявляє помірну анальгетичну активність.

Найактивнішою виявилась 3-хлоробензолоксамідо-етанова кислота III_p, яка зменшувала болову чутливість на хімічний подразник на 52,6 %, що практично дорівнює активності дії анальгіну та диклофенаку. Сполуки III_g ($R = 2\text{-CH}_3$) та III_i ($R = 3\text{-COOH}$) виявилися неактивними.

Висновки. 1. Синтезовано нову групу хімічних сполук – R-бензол-оксамідоетанові кислоти, структуру яких підтверджено даними елементного аналізу, УФ-, ІК- та ПМР-спектрів.

2. У результаті фармакологічного скринінгу виявлено речовини з вираженою фармакологічною активністю та низькою токсичністю.

Література

- Альрахаві Х. Синтез та біологічна активність арен-сульфонілоксаміол- та аренсульфогідразидооксаліламінокислот та їх солей з 2-етокси-6,9-діаміноакридином / Х. Альрахаві, Г. П. Петюнін, І. Л. Дикий // Фармац. журн. – 2008. – № 5. – С. 62–67.
- Синтез и биологическая активность 4-(N-R-оксамидосульфонил)-бензолметилоксаминовых кислот / И. П. Банный, Б. А. Самура, В. Е. Литаров [и др.] // Физиологично активные речевини. – 1999. – № 2 (28). – С. 47–49.
- Синтез і біологічна активність гідразиду та ацилгідразидів 4-сульфамілбензилоксамінової кислоти / І. П. Банный, В. П. Черних, Б. А. Самура [та ін.] // Вісник фармації. – 2001. – № 4 (28). – С. 9–12.
- Беленький М. Л. Элементы количественной оценки фармакологического эффекта / М. Л. Беленький. – 2-е изд. – Л. : Медицина, 1963. – С. 99 – 107.
- Гацура В. В. Методы первичного фармакологического исследования биологически активных веществ / В. В. Гацура. – М.: Медицина, 1977. – 131 с.
- Синтез, гостра токсичність та діуретична активність γ -(R-бензолсульфоніл-оксамідо)-бутанових кислот / В. А. Георгіянц, Н. І. Банна, В. М. Савченко, І. П. Банный // Вісник фармації. 2007. – № 4 (52). – С. 3–8.
- Синтез, гостра токсичність та біологічні властивості γ -(R-бензолоксамідо)-бутанових кислот та γ -(R-бензолсульфонілоксамідо)бутанових кислот / В. А. Георгіянц, Н. І. Банна, В. М. Савченко, І. П. Банный // Фармацевтичний журнал. – 2010. – № 2. – С. 34–40.
- Протизапальна та анальгетична активність γ -(R-бензолсульфонілоксамідо)бутанових кислот / В. А. Георгіянц, Н. І. Банна, В. М. Савченко, І. П. Банный // Укр. вісник психоневрології. – 2008. – Т. 16, вип. 3 (56), додаток. – С. 69–71.
- Доклінічні дослідження лікарських засобів: метод. рекоменд. / за ред. О. В. Стефанова. – К.: Авіцена, 2001. – 528 с.
- Машковский М. Д. Лекарственные средства: В 2-х томах. – 14-е изд. – М.: Новая волна, 2003. – Т. 1. – 540 с., Т. 2. – 608 с.
- Чекман И. С. Осложнения фармакотерапии / И. С. Чекман. – Киев: «Здоров'я», 1980. – 236 с.

СИНТЕЗ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ R-БЕНЗОЛОКСАМИДОЭТАНОВЫХ КИСЛОТ

Н. И. Банная¹, О. С. Крыськив¹, И. П. Банный¹, В. Н. Савченко²

¹Национальный фармацевтический университет, Харьков

²Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Резюме: с целью поиска веществ с диуретической, противовоспалительной и анальгетической активностью осуществлен синтез новой группы химических соединений – R-бензолоксамидоэтановых кислот. Структура синтезированных соединений доказана методами элементного анализа, УФ-, ИК- и ПМР-спектроскопии. Фармакологические исследования показали, что большинство соединений проявляют диуретическую, противовоспалительную и анальгетическую активность при низкой токсичности.

Ключевые слова: R-бензолоксамидоэтановые кислоты, фармакологическая активность, токсичность.

SYNTHESIS AND PHARMACOLOGICAL ACTIVITY OF THE R-PHENYLOXAMIDOETHANOIC ACIDS

N. I. Banna¹, O. S. Kryskiv¹, I. P. Bannyi¹, V. M. Savchenko²

¹*National University of Pharmacy, Kharkiv*

²*Kharkiv National University by V. N. Karazin*

Summary: with the purpose of search of substances with diuretic, antiinflammatory and analgesic activity the synthesis of a new group of R-phenyloxamidoethanoic acids was carried out. The structure of synthesized compounds was confirmed by methods of elemental analysis, UV-, IR- and NMR-spectroscopy. The pharmacologic researches showed that the majority of synthesized compounds displays diuretic, antiinflammatory and analgesic activity and low toxicity.

Key words: R-phenyloxamidoethanoic acids, pharmacological activity, toxicity.