

Матеріали та методи. У ході дослідження теми були використані зарубіжні наукові статті, особистий досвід, аналіз соціальних мереж. Також були взяті результати хімічних досліджень. Використовували емпіричні та теоретичні методи дослідження.

Результати дослідження. Усі процедури є умовно безпечними за умов дотримання протоколу процедур та використання сертифікованих продуктів. Алергічна реакція може супроводжувати кожен з наведених процедур, але, лише через особисте несприйняття організмом конкретних хімічних/натуральних речовин. На ринку заявлено близько 10 процедур для брів. А саме: ламінування, фарбування, тонування, корекція, проріджування, освітлення, «ботокс», татуаж та перманент. Також, на українському ринку наявні біля 40 брендів, що пропонують професійні засоби для брів. В ході дослідження було виявлено найчастіші випадки побічних ефектів та методи їх корекції.

Висновки.

- Асортимент продукції для брів повністю задовольняє потреби українських майстрів.
- Наявність сертифікованих товарів дозволяє проводити якісні безпечні процедури.
- Широкий спектр процедур задіює абсолютно різні механізми впливу на волосину. Порівнявши кожен, можна легко обрати найбільш ефективну для кожного клієнта.
- Побічні ефекти найчастіше виникають за умов не професійного користування. В рамках професійного кабінету можна заподіяти можливим ускладненням.

МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ КУПЕРОЗУ В КОСМЕТОЛОГІЧНОМУ КАБІНЕТІ

Єжелева А.А.

Науковий керівник: Рябова О.О.

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна
yezhelevaanna@gmail.com

Вступ. Проблема куперозу в косметології залишається актуальною, спонукаючи до пошуку ефективних методів лікування. Ця проблема вимагає комплексного підходу через вразливість кровоносних судин та слабкість зв'язкової тканини, що може бути спричинено екстремальними температурами та впливом холоду на обличчя. Робота присвячена огляду та систематизації методів корекції куперозу у косметологічних кабінетах. Вона спрямована на визначення найефективніших підходів для покращення якості життя пацієнтів та забезпечення оптимальних практик у галузі дерматології та косметології.

Мета дослідження. Метою роботи є дослідження методів корекції куперозу в косметологічному кабінеті.

Матеріали та методи. У виконанні роботи використано такі методи: аналіз літературних джерел з косметології та дерматології, порівняльний аналіз клінічних випадків та проведення інтерв'ю з пацієнтами та фахівцями косметології.

Результати дослідження. У ході дослідження було виявлено, що купероз значно впливає на зовнішній вигляд обличчя, викликаючи появу павутинних вен і капілярної сітки. Ці прояви проблеми можуть стати джерелом дискомфорту та незручностей для багатьох осіб. Основні фактори, які впливають на розвиток куперозу, включають генетичні особливості, слабкість сполучної тканини, вплив вагітності, гормональний фон, вікові зміни, вплив

ультрафіолетового випромінювання, стрес і перевтома. Ця проблема є актуальною як для чоловіків, так і для жінок, і часто пов'язана зі слабкістю сполучної тканини. Головними ознаками куперозу є поява маленьких розширених капілярів на обличчі, які утворюють характерні павутинні червоно-червоні відтінки. Крім цього, на сухій шкірі можуть з'являтися червоні плями. Запобігти цим проявам можна, уникнувши різких змін температури та регулярно зволожуючи шкіру, а також забезпечивши їй захист від сонця, навіть у холодний період року. Сучасні методи лікування куперозу включають нові техніки, які виявилися надзвичайно ефективними. Особливою у цьому плані є лазерна терапія та карбокситерапія. Використання лазерів, зокрема інтенсивного імпульсного світла (IPL), виявилось найкращим методом для зменшення проявів куперозу на шкірі. Карбокситерапія, яка базується на використанні вуглекислого газу, зміцнює та омолоджує шкіру, а також сприяє зменшенню куперозу, активізуючи природні процеси в тканинах. Ці методи не лише ефективно коригують купероз, але також покращують стан шкіри при інших дерматологічних захворюваннях.

Висновки. Отже, у результаті проведеного дослідження було виявлено, що лазерна терапія (IPL) та карбокситерапія виявилися високоефективними методами у зменшенні проявів куперозу та покращенні стану шкіри. Ці методи варто враховувати при розробці комплексного підходу до лікування куперозу в косметологічній практиці.

КОРЕКЦІЯ АЛОПЕЦІЙ В УМОВАХ КОСМЕТОЛОГІЧНОГО САЛОНУ

Здесенко Р.О., Башура О.Г.

Науковий керівник: Кран О.С.

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна

lanazdesenko@gmail.com

Вступ. Облисіння (алопеція), порідіння і випадання волосся – це неприродне випадіння волосся, яке призводить до його втрати на голові, а також на інших частинах тіла. Втрата може бути як часткова, так і повна. Найчастіше облисіння зазнає шкіра голови. Виразність ознак облисіння у чоловіків та жінок залежить від виду захворювання. Виділяють такі форми алопеції:

Андрогенна: діагностується переважно у чоловіків 30-35 років у зв'язку з підвищенням рівня андрогенних гормонів. При цьому довге волосся замінюється на пушкове. Перші залисини з'являються у скроневих областях і поступово поширюються на тім'яну зону. Рубцова: характеризується відсутністю волоссяних цибулин на ділянках облисіння. Серед причин рубцевої алопеції виділяють уроджені аномалії, інфекційні захворювання, тривалий прийом стероїдних препаратів, опіки та обмороження, вплив агресивних хімічних речовин. Гнізда: ділянки облисіння з'являються раптово, переважно у сфері бороди, вусів, брів і вій. Вони мають округлу форму та різний розмір. Точні причини появи гніздової алопеції невідомі. Себорійна: перші ознаки облисіння починаються під час статевого дозрівання. Спочатку волосся стає жирним і блискучим, а потім стоншується і рідшає. Залисини поступово нарастають. Характерною рисою себорейної алопеції є наявність вузької стрічки здорового волосся навколо вогнища облисіння. Травматична: виникає у зв'язку з тривалим травмуванням волоссяних фолікулів.

При корекції різних форм алопеції та для профілактики симптомів випадіння волосся, на сьогоднішній день найбільш поширено застосовуються ін'єкційні методи: мезотерапія та