

Висновки. Реабілітація після ендопротезування колінного суглобу має важливу роль у відновленні функціональності та покращенні якості життя пацієнтів. Інтенсивна фізична реабілітація показала свою ефективність у покращенні результатів, і вона рекомендується для пацієнтів, яким проведено ендопротезування колінного суглобу. Системний аналіз наукової літератури підтверджує важливість індивідуального підходу до реабілітації та постійного моніторингу пацієнтів для досягнення найкращих результатів у лікуванні.

ОНОВЛЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МОЗ УКРАЇНИ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ COVID-19

Ступак А.О.

Науковий керівник: Жаботинська Н.В.

stupakanastasia@icloud.com

Вступ. У жовтні в Україні почався епідемічний сезон вірусних інфекцій: серед населення зростає захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19. Лише за жовтень 2023 року було зареєстровано 119 063 випадки захворювань. Протягом жовтня місяця в Україні зафіксували 9 827 нових випадків COVID-19, з яких 51 призвели до смерті від ускладнень.

Мета дослідження. Вивчити та ознайомити здобувачів вищої освіти НФаУ з оновленими рекомендаціями МОЗ України про вакцинацію проти COVID-19.

Матеріали та методи. В ході дослідження було вивчено Наказ МОЗ України від 27.09.2023 № 1700, яким було затверджено оновлені рекомендації з вакцинації проти COVID-19.

Результати дослідження. Основною метою оновлення рекомендацій є запобігання тяжким випадкам COVID-19, особливо серед груп ризику, та захист системи охорони здоров'я. Національна технічна група експертів з імунізації (НТГЕІ) відзначає важливість вакцинації раніше нещеплених осіб, що входять до групи ризику для тяжкого перебігу COVID-19. Оновлені рекомендації є тимчасовими та можуть змінюватися залежно від оновлених даних.

НТГЕІ визначила пріоритетні групи для вакцинації проти COVID-19 та введення бустерних доз у 2023-2024 роках. Перший курс вакцинації включає дві дози за різними схемами або одну дозу, яку визначено інструкцією до вакцини, і додаткова доза враховується до першої вакцинації. Завершений первинний курс щеплень включає проведену первинну вакцинацію та отримання першої бустерної дози вакцини. Додаткові бустерні дози можуть бути введені після отримання першої бустерної дози будь-якою доступною вакциною, з врахуванням пріоритету вакцини, адаптованої під варіант Omicron. Особи з порушеннями схеми вакцинації та без другої дози чи першої бустерної дози повинні їх отримати при першій можливості, дотримуючись мінімального інтервалу. Для різних груп, таких як літні люди, особи з серйозними захворюваннями, імунокомпрометовані, вагітні та медичні працівники, визначені конкретні інтервали для бустерних доз відповідно до віку та стану здоров'я.

Висновки. Оновлені рекомендації з вакцинації проти COVID-19 дозволять зменшити захворюваність, захистити населення від важких форм перебігу COVID-19 та знизити ризик розвитку ускладнень.