

- Якщо з'являються симптоми ураження ШКТ (біль, печія і т.д.) необхідно терміново звернутись до лікаря;
- Всі НПЗЗ можуть знижувати дію антигіпертензивних препаратів. Під час застосування НПЗЗ необхідно постійно контролювати артеріальний тиск та звернутись по допомогу до лікаря, якщо звичні дози антигіпертензивних засобів не тримають артеріальний тиск у межах норми.
- Всі НПЗЗ можуть сприяти прогресуванню хронічної серцевої недостатності. При появі та посиленні симптомів хронічної серцевої недостатності (набряки на кінцівках, задишка) пацієнтам необхідно звернутись до лікаря.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСУ В ПРАКТИЦІ ФАРМАЦЕВТА КЛІНІЧНОГО

Пламінська К.В., Жулай Т.С., Андрєєва О.О.

Науковий керівник: Ткаченко К.М.

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна
t.kateryna.13@gmail.com

Вступ. Актуальність надання ефективної медичної допомоги пацієнтам, що знаходяться в септичних станах з точки зору доказової медицини, актуальна та необхідна, особливо у воєнний час. Найбільш обговорюваним питанням на міжнародних консенсусах та конгресах, які присвячені неонатальному сепсису, є висока летальність від цього захворювання як в Україні, так і в світі. Кількість летальних випадків можна запобігти, враховуючи те, що сепсис має особливий та критичний по часу клінічний перебіг, який на ранніх стадіях значною мірою піддається лікуванню. Необхідно визнати те, що хоч сам сепсис не завжди можна спрогнозувати, його несприятливі наслідки можна пом'якшити завдяки ранній діагностиці та при своєчасно розпочатому лікуванні.

Мета дослідження. Підвищити ефективність лікування неонатального сепсису шляхом застосування антибактеріальних засобів в умовах роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей комунального некомерційного підприємства Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Миколаївської обласної ради.

Матеріали та методи. Аналіз даних літератури та Інтернет-джерел: MEDLINE/PubMed, EMBASE, LILACS, Web of Science, Cochrane Infectious Diseases Group Specialized Register, Scopus та Index Copernicus.

Результати дослідження. Проведено аналіз медичних карт стаціонарних хворих (історій хвороб) з діагнозом сепсис за період 2021 – 2023 роки. Враховуючи імунологічні та фізіологічні особливості новонароджених, індивідуально визначалася стратегія лікування. Оцінювали параметри: клінічних та лабораторних показників, вибір антимікробного препарату, тривалість лікування, вибір оптимальних доз, оцінка ефективності антимікробних препаратів різних груп та їх комбінацій з урахуванням видів інфекційних патогенів та антимікробної чутливості.

Висновки. Сепсис є соціально-економічною проблемою, має високу летальність, високий ризик інвалідності, що має негативні економічні наслідки для країни. Поглиблене розуміння сучасних механізмів розвитку сепсису дозволить більш ефективно проводити діагностику та лікування септичних станів, що своєю чергою зменшить смертність і негативні наслідки після перенесеного сепсису у дітей.