

ОЦІНКА СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПРИГНІЧУЮТЬ ПЕРИСТАЛЬТИКУ

Герасимова О. О., Ткачова О. В.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

o.a.gerasymova@gmail.com

Вступ. Діарея є однією з найчастіших причин звернення пацієнтів за медичною допомогою. Вона виникає через різноманітні причини, може бути симптомом гострих та хронічних захворювань та варіювати від легкого, тимчасового стану до потенційно небезпечного для життя. Для зменшення частоти кишкових випорожнень та проявів діареї призначають лікарські засоби (ЛЗ), що пригнічують перистальтику.

Мета. Оцінка обсягу та структури споживання ЛЗ групи А07D «Засоби, що пригнічують перистальтику» в Україні в 2021-2022 роках.

Матеріали та методи. Об'єкти дослідження – представники лікарських засобів групи А07D «Засоби, що пригнічують перистальтику». Оцінку споживання ЛЗ проводили за допомогою АТC/DDD-методології, яка включає дві складові: анатомо-терапевтично-хімічну класифікацію лікарських засобів та їх середні підтримуючі добові дози, що застосовуються за основним показанням у дорослих (DDD – defined daily dose). Під час проведення дослідження розраховували міжнародний показник DDDs/1000 жителів/день (DID). Кількість міжнародних непатентованих назв (МНН), торгових найменувань та реалізованих за рік упаковок ЛЗ в Україні була взята з інформаційної системи «Pharmexplorer» компанії «Моріон». Дози DDD препаратів взяті із сайту ВООЗ (<https://www.whooc.no/>). За їх відсутності розраховували середню добову дозу PDD (prescribed daily dose) за допомогою інструкції до медичного застосування.

Результати. Група А07D «Засоби, що пригнічують перистальтику» була представлена в Україні у 2021-2022 роках 2 МНН (лоперамід та «лоперамід + симетикон») та 17 торговими найменуваннями. Обсяги споживання ЛЗ даної групи за показником DDDs/1000 жителів/день у 2021-2022 роках в Україні складали, відповідно, 1,50 DID та 1,43 DID. Найбільший рівень споживання у досліджуваній період встановлено для препаратів лоперамиду (2021 рік – 1,48 DID; 2022 рік – 1,41 DID), найменший – для комбінації «лоперамід + симетикон» (2021-2022 роки – по 0,02 DID).

Висновки. В Україні у 2021-2022 роках приблизно від 0,14 % до 0,15 % населення щодня приймали 1 DDD одного з ЛЗ групи А07D «Засоби, що пригнічують перистальтику». З роками обсяги споживання ЛЗ даної групи в країні мали тенденцію до зменшення. Результати даного дослідження можуть стати в нагоді організаторам охорони здоров'я при прийнятті регуляторних рішень щодо раціонального використання представників групи А07D «Засоби, що пригнічують перистальтику» та реімбурсації їх вартості.