

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ИНСУЛИНОВ В УКРАИНЕ ЗА ПЕРИОД 2008-2012 гг

Яковлева Л.В., Кириченко О.Н.

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина

Резюме: проведен анализ потребления препаратов инсулина на фармацевтическом рынке Украины по данным 2008 - 2012гг. с использованием АТС/DDD методологии по показателю DDDS/1000 жителей/день. Определен низкий уровень потребления по сравнению с европейскими странами и его снижение по сравнению с показателями 2008г. По данным структурного анализа показано недостаточное применение аналогов инсулина. Наибольший уровень потребления приходится на препараты инсулина человеческого. Данные по обеспеченности препаратами инсулина больных СД 1-го типа, без учета их потребления больными СД 2-го типа свидетельствуют о несоответствии объема потребления уровню заболеваемости СД 1-го типа.

Ключевые слова: анализ потребления, препараты инсулинов, сахарный диабет.

Введение. Изучение объемов и структуры потребления препаратов инсулина как в розничном, так и в госпитальном сегменте и сопоставление их с распространенностью сахарного диабета (СД) в Украине позволяют оценить реальную обеспеченность и структуру потребления препаратов этой группы. Данные такого анализа также отображают соответствие их применения современным стратегиям лечения и обосновывают необходимость пересмотра использования нерациональных (менее клинически и экономически эффективных) схем терапии СД. На сегодняшний день приоритетным является использование стратегий, которые обеспечат стабилизацию гликемии и поддержание ее целевых значений, и как следствие позволят снизить преждевременное развитие осложнений, инвалидизацию, смертность больных СД и связанные с ними затраты как государства, так и больного. На мировом рынке инсулина за последнее десятилетие возрос уровень потребления группы аналогов инсулина, обладающих определенными преимуществами перед человеческими инсулинами и инсулинами животного происхождения.

В исследовании изучались объемы и структура потребления препаратов группы инсулинов на основе данных госпитального и розничного сегмента фармацевтического рынка Украины с целью оценки обеспеченности больных СД препаратами инсулина.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования были данные потребления препаратов группы инсулинов аналитической системы исследования рынка "PharmXplorer/Фармстандарт" компании "Proxima Research". Объем потребления ЛС оценивали с помощью АТС/DDD методологии по показателю DDDS/1000 жителей/день. Данный показатель дает представление о доле населения, которое получает определенный вид лечения. Сравнительный анализ потребления инсулинов проводился по данным 2008 - 2012 годов.

Полученные результаты и их обсуждение. Анализ потребления препаратов инсулина на фармацевтическом рынке Украины установил наличие следующих его видов: группа А10А В – инсулины ультракороткого действия - ИУКД (аналоги инсулина человека) и короткого действия - ИКД (инсулин растворимый человеческий генно-инженерный и инсулин свиной); группа А10А С – инсулины средней продолжительности действия и их аналоги - ИСПД (инсулин человеческий генно-инженерный и инсулин свиной); группа А10А Е – инсулины длительного действия - ИДД (аналоги инсулина человека); группа А10А D – двухфазные инсулины (смеси ИКД и НПХ-инсулинов и смеси ИУКД и НПХ-инсулинов).

Сравнительный анализ потребления препаратов инсулина за 5-ти летний период показал снижение общего объема потребления по показателю DDDS/1000 жителей/день в 2012 г. на 29,65% по сравнению с 2008г., что крайне сложно прокомментировать, поскольку количество зарегистрированных больных СД 1-го типа в сравнении с 2008 годом увеличилось на 14,37% (табл.1).

При сравнении с другими странами потребление препаратов инсулина в Украине находится на очень низком уровне. Например, общий объем потребления во Франции, Германии, Великобритании, Австралии в 2011 году составил соответственно 13,84, 29,15, 19,09, 17,4 DDDS/1000 жителей/день [10]. В Литве в 2008 году он определялся на уровне 8,85 DDDS/1000 жителей/день, в Норвегии в 2008, в 2012 - соответственно 18,87 и 18,88 DDDS/1000 жителей/день в сравнении с 4,86 и 3,44 DDDS/1000 жителей/день в Украине за аналогичные периоды (табл.1) [11,12].

При сопоставлении данных потребления с уровнем заболеваемости в Украине установлено, что обеспеченность инсулиновыми препаратами больных СД 1-го типа, без учета их применения у больных СД 2-го типа, в 2012 г. составила 289,68 дня лечения в год на одного больного. В пересчете на количество зарегистрированных больных СД 1-го типа ежедневная обеспеченность 1 DDD суммарного инсулина приходится на 79,61% больных. Полученные данные свидетельствуют о несоответствии объема потребления уровню заболеваемости. Кроме того, реальная обеспеченность препаратами инсулина значительно ниже, поскольку при проведении расчетов не учитывались данные о количестве больных СД 2-го типа, применяющих инсулины, из-за их неполноты в связи с продолжающейся работой по формированию действенного реестра больных СД в Украине. Динамика потребления инсулинов за период 2008 - 2012 г.г. по показателю DDDS/1000 жителей/день представлена в табл. 1.

В структуре потребления инсулина в 2012г. лидирующие позиции в общем объеме потребления принадлежат группам А10А С (ИСПД) и А10А В (ИКД и ИУКД) с долевым участием 37,21% и 34,88% соответственно. Доля группы А10А D (смеси ИКД и НПХ-инсулинов, смеси ИУКД и НПХ-инсулинов) составляет 25,29%. Относительно малый объем потребления отмечается для группы А10А Е (ИДД) - 2,82%. Группа болюсных инсулинов (А10А В), применяющихся для контроля постпрандиальной гликемии (ППГ), представлена ИУКД и ИКД. Общий объем их потребления в 2008 и 2012 г.г. определяется на уровне 1,76 и 1,20 DDDS/1000 жителей/день, что значительно ниже, чем, например, в Норвегии за аналогичные периоды (6,82 и 7,22 DDDS/1000 жителей/день соответственно) [12]. Лидерами по объему потребления в группе А10А В по итогам 2008, 2012 годов являются ИКД с долевым участием 96,02 и 91,67% соответственно. В абсолютных значениях их объем потребления в 2008 г. составил 1,69 DDDS/1000 жителей/день и уменьшился на 34,91% до 1,10 DDDS/1000 жителей/день в 2012 г. За период исследования отмечается незначительный рост (с 3,98% до 9,01%) долевого участия в группе А10А В ИУКД. Их объем потребления увеличился с 0,065 в 2008 г. до 0,096 DDDS/1000 жителей/день в 2012 г. Для сравнения по данным 2008 г. на долю группы ИКД в Литве приходится около 9%, а доля потребления группы ИУКД – инсулина аспарагина, инсулина глулизина, инсулина лиспро составляет 49%, 27% и 15% соответственно. Следует отметить в Украине значительное (на 95,83%) снижение потребления свиного инсулина в 2012 г. по сравнению с 2008 г. (с 0,05 до 0,002 DDDS/1000 жителей/день). Уменьшилась на 15,25% по сравнению с начальным периодом и доля инсулинов украинского производства. Таким образом, проведенный структурный анализ потребления инсулинов, применяющихся для контроля ППГ, свидетельствует о незначительных объемах потребления ИУКД по сравнению с ИКД.

В сравнительном аспекте в группе болюсных инсулинов оптимальный фармакокинетический профиль, соответствующий эндогенной пиковой секреции инсулина здорового человека, отмечается у ИУКД. В отличие от ИКД, они обеспечивают быстрое начало действия, совпадение пиков концентрации инсулина в крови с пиком ППГ, а более активная их элиминация позволяет избежать эффекта наложения и, таким образом, предотвращать развитие гипогликемических состояний. Человеческий генно-инженерный ИКД оказывает макси-



мальный эффект только после всасывания основной части углеводов после приема пищи, и, следовательно, действие инсулина настигает ту гипергликемию, которая уже возникла. Кроме того, уровень инсулина в плазме остается повышенным до 6 часов, что увеличивает риск развития гипогликемий перед следующими приемами пищи. Также у ИКД отмечают значительную вариабельность ежедневных профилей действия инсулинов с различиями в пиковых концентрациях до 20–30%, что затрудняет индивидуальный подбор эффективной дозы препарата [1,4]. Перечисленные характеристики существенно ограничивают эффективность ИКД относительно контроля ППГ.

Следует отметить, что контроль ППГ относят к важной составляющей стратегии по предотвращению развития и прогрессирования кардиоваскулярной патологии, поскольку быстрое и значительное повышение показателей глюкозы крови после еды, а не гликемия натощак, является прямым фактором формирования эндотелиальной дисфункции, прогрессирования атеросклероза и развития осложненной диабета. Контроль ППГ наряду с гликемией натощак и HbA1c включен в рекомендации по лечению СД в качестве важного показателя, отражающего состояние метаболического контроля [1,4].

По-видимому, использование в Украине в преобладающем объеме ИКД можно обосновать ценовым фактором. Стоимость 1 DDD ИКД составляет от 0,41 до 0,58, в то время как стоимость ИУКД варьирует в диапазоне от 1,15 до 1,48 € за 1 DDD. Для сравнения стоимость 1 DDD ИУКД в Нидерландах, Швеции и Великобритании меньше и составляет от 0,95 до 1,12 €. Приведенные данные обосновывают большую доступность ИКД.

Среди инсулинов, применяющихся для заместительной базальной инсулинотерапии (группа A10A C (ИСПД) и группа A10A D (ИДД)), наибольший объем потребления за исследуемый период приходится на группу ИСПД. Их доля в группе базальных инсулинов по итогам 2008, 2012 г.г. достигает 92,55% и 92,97% соответственно, а в абсолютном выражении составляет 1,96 и 1,28 DDDS/1000 жителей/день. По сравнению с данными 2008 г. отмечается уменьшение на 34,69% в 2012 г. потребления препаратов данной группы. В структуре потребления ИСПД, аналогично данным по потреблению ИКД, значительно (на 90,38%) по сравнению с 2008 г. уменьшилось потребление свиного инсулина и, практически, не изменилась доля потребления инсулинов отечественных производителей (65,31% в 2008 г. и 62,11% в 2012 г.). Лидерство по потреблению в группе ИСПД по данным 2012 г. принадлежит 2 ЛП – «Протафан® НМ», (Дания) и «Фармасулин® Н НР», (Украина) с объемом потребления 0,44 и 0,51 DDDS/1000 жителей/день. Доля ИДД среди базальных инсулинов незначительна и составляет 7,45% по итогам 2008 г. и 7,03% по итогам 2012 г., в абсолютном выражении – 0,158 и 0,097 DDDS/1000 жителей/день соответственно. Большой объем потребления за исследуемый период приходится на инсулин гларгин (0,09 DDDS/1000 жителей/день в 2008 г. и 0,073 DDDS/1000 жителей/день в 2012 г.). Для сравнения в группе базальных инсулинов долевое участие группы ИДД в Норвегии в 2012 г составляло 31,52%, по данным 2008 в Норвегии и Литве – 20,67% и 70,81% соответственно [11,12].

Среди инсулинов, применяющихся для заместительной базальной инсулинотерапии более надежный гликемический контроль вне приема пищи и во время сна оказывают высокотехнологичные препараты беспикового действия - ИДД (инсулин гларгин и инсулин детемир). Они имитируют достаточно ровную (плавную) базальную секрецию инсулина, отличаются меньшей вариабельностью, практически суточной длительностью действия (20–24 ч.) и обеспечивают клинически значимое и сопоставимое снижение уровня гликемии с одинаково низким риском развития гипогликемий [2]. Наиболее широко используемая группа ИСПД предполагает многократное введение препарата в течение суток, координацию инъекций с приемом пищи и физическими нагрузками, регулярный контроль гликемии. Такие ограничения отрицательно сказываются на качестве жизни, нередко приводят к нарушениям режима терапии и не обеспечивают достижения относительно равномерного уровня базальной инсулинемии в течение суток, что повышает вероятность возникновения гипогликемий. Многочисленными исследованиями, в которых сравнивали терапию ИДД и НПХ-инсулином, при их сопоставимом контроле уровня гликемии у ИДД показан лучший профиль безопасности (в отношении снижения риска гипогликемий – тяжелых, ночных, документированных) [2,3].

При рассмотрении ценовых характеристик базальных инсулинов в Украине стоимость 1 DDD ИСПД составляет от 0,41 до 0,82 €, цена ИДД находится в диапазоне от 1,89 до 2,38 € за 1 DDD. Для сравнения стоимость 1 DDD ИДД в Нидерландах, Швеции и Великобритании составляет от 1,48 до 1,65 € [8].

Наибольший объем потребления в структуре группы двухфазных инсулинов приходится на препараты группы A10A D01 (смеси ИКД и НПХ-инсулинов) – 96,94% в 2008 г. и 97,21% в 2012 г. Лидирующие позиции по объему потребления по итогам исследуемого периода принадлежат препаратам отечественных производителей (табл. 1.). Доля потребления препаратов группы A10A D04 – D05 (смеси ИУКД и НПХ-инсулинов) незначительна, а их стоимостные характери-

сти в 2 раза выше от 1,15 до 1,32 € за 1 DDD, по сравнению с 0,41 – 0,58 € за 1 DDD для группы A10A D01.

Таким образом, оценка потребления препаратов инсулина на фармацевтическом рынке Украины за пятилетний период определила, что структура потребления практически не изменилась. Наибольший уровень потребления от общего объема (92,63% 2008 г. и 93,43% в 2012 г.) приходится на препараты инсулина человеческого – ИКД и ИСПД, смеси ИКД и ИСПД. В малом объеме (5,21% в 2008 г. и 6,11% в 2012 г.) используются препараты аналогов инсулина человека – ИУКД и ИДД. Незначительный объем потребления свиного инсулина, который отмечался на уровне 18% в 2005 г. снизился до 2,16% в 2008 г. и до 0,2% в 2012 г. и в целом отражает современные тенденции потребления препаратов данной группы.

На международном рынке потребления инсулинов прослеживается увеличение потребления дорогостоящих аналогов инсулина, снижение объемов потребления человеческого инсулина и значительное уменьшение использования инсулина животного происхождения. По состоянию на 2009 г. менее 25% стран в мире употребляли в незначительном количестве какой-либо из инсулинов животного происхождения. Так, например, в Великобритании в 2008 г. доля инсулинов животного происхождения составила 0,7% в сравнении с 2,9% в 2000 г., аналогов инсулина – 76,15% в 2008 г. в сравнении с 10,7% в 2000 г. и человеческого инсулина – 23,2% в 2008 г. в сравнении с 86,3% в 2000 г. В структуре потребления Литвы в 2008 г. долевое участие инсулинов животного происхождения не указывается, на долю человеческого инсулина и аналогов инсулина приходится 11,48% и 88,52% соответственно. Доля аналогов инсулина в Дании в 2009 г составляет 61,63% от всех используемых инсулинов [7,9].

Следует отметить, что структура потребления мирового рынка инсулинов неоднородна и характеризуется 3 направлениями. Для стран с высоким уровнем доходов аналоги инсулина составляют две трети от всех потребляемых инсулинов, препараты человеческого инсулина – одну треть. На долю препаратов человеческого инсулина в странах со средним уровнем доходов приходится две трети от всех потребляемых инсулинов. Отмечают снижение использования этой группы инсулинов и в странах с низким уровнем доходов, однако их часть в структуре потребления по-прежнему значительна (более 90% от всех используемых инсулинов). На глобальном уровне определяют две составляющие сдерживания потребления аналогов инсулина – отсутствие убедительных доказательств их преимуществ в отношении контроля HbA1c и глобальный экономический кризис. В то же время, увеличение потребления аналогов инсулина обосновывают не только их определенными выгодами, но и активной маркетинговой стратегией производителей инсулинов [9].

По оценке Международного фонда инсулина (ИФ) для стран с ограниченными ресурсами здравоохранения, преобладание в структуре потребления человеческого инсулинов при их соответствующем использовании является вполне обоснованным и допустимым. Основные приоритеты аналоговых инсулинов по сравнению с человеческим инсулином связывают с более низкой частотой гипогликемических состояний, удобством применения, повышением приверженности к лечению и улучшением качества жизни. В тоже время, имеются доказательства (данные мета-анализов, систематического обзора) отсутствия значимых различий между ними в отношении обеспечения и поддержания целевых значений HbA1c [14–16]. Исходя из чего некоторые страны в отношении ряда препаратов аналогов инсулина пересматривают и ограничивают их возмещение для определенных категорий пациентов [6,13]. Важно отметить, что, по мнению экспертов, определенные преимущества аналогов инсулинов нивелируются в отсутствии средств самоконтроля. Поэтому в странах со сложной экономической ситуацией целесообразней использовать ограниченные ресурсы для обеспечения всех нуждающихся препаратами человеческого инсулина и на проведение мероприятий, повышающих отдачу от их применения (на обучающие программы и на приобретение средств самоконтроля, тест-полосок и мониторинг гликемического контроля).

Недостаточное использование современных аналогов инсулина человека может объясняться не только ограниченными возможностями государственного финансирования в Украине, но и сравнительно высокой их утилитарной стоимостью по сравнению со многими странами. Так, по сравнению с референтными странами (основными – Албания, Болгария, Турция, Молдова, Россия, Румыния и резервными – Венгрия, Латвия, Литва, Чехия, Польша) цена на препараты инсулина в Украине отличается на 17,02% - 139,08%. Например, по сравнению с минимальной ценой в Турции стоимость в Украине на инсулин глутлизин (Эпайдра®, Sanofi) выше на 139,08%, а на инсулин лиспро в составе 2-х фазного инсулина (Эпайдра®, Sanofi) по сравнению с минимальной ценой в Румынии – выше на 67,08% [5].

Также, существующая в Украине тендерная система закупки препаратов инсулина ограничивает возможность оперативно по показаниям изменять инсулинотерапию и приводит к нерациональному использованию финансовых ресурсов.

Вероятно, осуществление заявленной МОЗ Украины программы по введению референтных цен на препараты инсулина будет способствовать росту уровня обеспеченности больных СД аналоговыми инсулинами.

Таким образом, формирование в Украине должной структуры потребления препаратов инсулина (увеличение доли препаратов, обеспечивающих качественное лечение больных СД) должно осуществляться при наличии доказательной базы их клинической эффективности, доказательств экономической целесообразности на основе фармакоэкономической экспертизы и с использованием механизма референтного ценообразования для всех препаратов, включенных в программу государственного возмещения.

Выводы:

- объем потребления препаратов инсулинов больными СД 1-го типа, без учета их применения у больных СД 2-го типа, не соответствует уровню заболеваемости СД 1-го типа;
- наибольший уровень потребления пока приходится на препараты инсулина человеческого в отличие от развитых стран, в которых наблюдается высокий уровень потребления аналогов инсулина;
- отмечается недостаточное использование современных высокоэффективных препаратов аналогов инсулина человека (инсулина ультракороткого и длительного действия);
- потребление инсулинов в Украине по показателю DDDS/1000 жителей/день по сравнению с некоторыми европейскими странами находятся на очень низком уровне;
- общий объем потребления в 2012 г. снизился на 29,65% по сравнению с 2008 г.;
- определена необходимость проведения фармакоэкономической экспертизы перед включением того или иного препарата в программы государственного возмещения.

Литература:

1. Бирюкова Е.В., Гарбузова М.А. // Сахарный диабет. – 2010. - №3(48). – С. 72-77.
2. Вербовая Н.И. // Проблемы эндокринологии. - 2010. - № 2. - С. 64-71.
3. Дедов И.И., Шестакова М.В., Моисеев С.В. // Клиническая фармакология и терапия. – 2005. - №14 (2) , <http://www.voed.ru/>.
4. Немченко А.С., Тораев К., Корж Ю.В.//Фармакоэкономика в Украине: стан и перспективы развития. -2013. – С.235-237.
5. Cumming J., Mays N., Daube J. //BMJ. 2010; 340; 2441 с.
6. Currie CJ, Peters JR, Evans M.// Diabet Med. 2010; 27:744–752.
7. Drummond M., Jonsson B., Rutten F., Stargardt T. // Eur J Health Econ. 2011; 12:263–271.
8. Gill G.V., Yudkin J.S., Keen H., Beran. D. // Diabetologia. 2011; Jan; 54(1): 19-24.
9. <http://www.irdes.fr/EspaceAnglais/Publications/IrdesPublications/QES187.pdf>.
10. <http://vddb.library.lt/fedora/get/LT>.
11. <http://www.fhi.no/dokumenter/5cf2f40d01.pdf>.
12. http://www.idf.org/German_analogue_insulin_issue, accessed 15 June 2010.
13. Monami M, Marchionni N, Mannucci E. // Diabetes Research and Clinical Practice. 2008; 81(2):184-9.
14. Singh S.R, Ahmad F, Lal A et al. /Canadian Medical Association Journal. 2009; 17; 180(4): 385-97.
15. Vardi M, Jacobs E, Nini A et al. // Cochrane Database Systematic Review, 2008; 16 (3).



Таблица 1.

Динамика потребления инсулинов за период 2008 - 2012 г.г. по показателю DDSD/1000 жителей /день

Код АТС	Вид инсулина	Торговое наименование	DDSD/1000 жителей/день		Δ, %
			2008 г.	2012 г.	
1		2	3	4	5
Группа болюсных инсулинов - А10А В					
А10А В01, А10А В03 короткого действия	Инсулин человеческий генноинженерный	Актрапид® НМ Пенфилл® (Дания)	0,48	0,45	- 6,25
		Генсулин Р, Bioton (Польша)	-	0,005	-
		Инсуман® Рапид, Sanofi (Франция)		0,01	-
		Фармасулин® Н, Фармак (Украина)	0,55	0,37	- 32,73
		Хумодар® Р100Р, Индар (Украина)	0,57	0,24	- 57,89
		Хумулин® Регуляр, Eli Lilly (США)	0,04	0,02	- 50,0
		Всего: абс. / % от объема потребления в группе А10А В01, А10А В03	1,64 / 97,04	1,10 / 99,82	- 67,07
	Инсулин свиной	Монодар®, Индар (Украина)	0,05 / 2,96	0,002 / 0,18	- 95,83
Итого потребление по группе А10А В01, А10А В03: абс. / %			1,69 / 100	1,102 / 100	- 34,91
А10А В04, А10А В05, А10А В06 ультракороткого действия	Инсулин лиспро	Хумалог®, Eli Lilly (США)	0,005	0,005	-
	Инсулин аспарагин	Новорапид® Флекспен®, Novo Nordisk (Дания)	0,06	0,055	- 8,33
	Инсулин глулизин	Эпайдра®, Sanofi (Франция)	-	0,036	-
	Итого потребление по группе А10А В04, В05, В06: абс. / %			0,065 / 100	0,096 / 100
Всего по группе А10А В: абс. / % от общего объема потребления всех инсулинов			1,76 / 36,21	1,20 / 34,88	- 31,82
Группа базальных инсулинов - А10А С					
А10А С01, А10А С03 средней продолжительности действия и аналоги	Инсулин человеческий	Генсулин Н, Bioton (Польша)	-	0,009	-
		Инсуман® Базал, Sanofi (Франция)	-	0,017	-
		Протафан® НМ, Novo Nordisk (Дания)	0,65	0,44	- 32,31
		Фармасулин® Н НР, Фармак (Украина)	0,69	0,51	- 26,08
		Хумодар® Б100Р, Индар (Украина)	0,54	0,28	- 48,15
		Хумулин® НРХ, Eli Lilly (США)	0,032	0,021	- 34,38
	Всего по группе: абс. / % от объема потребления в группе А10А С01, А10А С03	1,91 / 97,45	1,27 / 99,22	- 66,49	
Инсулин свиной	Монодар® Б, Индар (Украина)	0,052 / 2,55	0,005 / 0,78	- 90,38	
Итого потребление по группе А10А С: абс. / %			1,96 / 100	1,28 / 100	- 34,69
Всего по группе А10А С: абс. / % от общего объема потребления всех инсулинов			1,96 / 40,33	1,28 / 37,21	- 34,69
Группа базальных инсулинов - А10А Е					
А10А Е04, А10А Е05 длительного действия	Инсулин гларгин	Лантус®, Sanofi (Франция)	0,09	0,073	- 18,89
	Инсулин детемир	Левемир® Флекспен® (Дания)	0,068	0,024	- 64,71
Всего по группе А10А Е: абс. / % от общего объема потребления всех инсулинов			0,158 / 3,25	0,097 / 2,82	- 38,61
Всего по группе базальных инсулинов (А10А С и А10А Е): абс. / % от общего объема потребления всех инсулинов			2,12 / 43,62	1,38 / 40,12	- 65,09
Группа двухфазных инсулинов - А10А D					
А10А D01, Смеси инсулинов короткого действия и НРХ-инсулинов	Инсулин двухфазный человеческий генноинженерный	Инсуман® КОМБ 25, Sanofi (Франция)	-	0,027	-
		Микстард® 30 НМ, Novo Nordisk (Дания)	0,12	0,04	- 65,0
		Фармасулин® Н 30/70, Фармак (Украина)	0,34	0,48	- 29,17
		Хумодар® К25, Индар (Украина)	0,48	0,29	- 30,58
		Хумулин® М3, Eli Lilly (США)	0,013	0,004	- 69,23
Всего по группе А10А D01: абс. / % от объема потребления в группе А10А D			0,95 / 99,94	0,84 / 97,67	- 11,58
А10А D04, А10А D05 Смеси инсулинов ультракороткого и НРХ-инсулинов	Инсулин лиспро	Хумалог® МИКС 50, Eli Lilly (США)	-	0,004	-
	Инсулин аспарагин	Новомикс® 30 Флекспен® (Дания)	0,03	0,02	-33,33
	Всего по группе: абс. / % от объема потребления в группе А10А D			0,03 / 3,06	0,02 / 2,33
Итого потребление по группе А10А D: абс. / %			0,98 / 100	0,024 / 100	- 40,0
Всего по группе А10А D: абс. / % от общего объема потребления всех инсулинов			0,98 / 20,16	0,86 / 25,00	- 12,24
Итого, общее потребление препаратов инсулина: абс. / %			4,86 / 100	3,44 / 100	29,22

Δ - разница в объемах потребления (%) за исследуемый период

DYNAMICS OF INSULIN CONSUMPTION IN UKRAINE OVER A PERIOD OF 2008-2012

Iakovlieva L. V., Kyrychenko O. N.

The National University of Pharmacy, city of Kharkiv, Ukraine

Summary: The analysis of insulin agents' consumption in the pharmaceutical market of Ukraine as of the data of years 2008-2012 has been carried out using the ATC/DDD methodology in terms of DDDS/1000 of persons/day. The low level of consumption, compared to the European countries, as well as its reduction, compared to the data of 2008, has been determined. The structural analysis has shown low insulin consumption. The highest consumption level has been determined for the human insulin agent. The data on provision of PD-1 patients with insulin medications, without consideration of PD-2 patients' consumption, evidence the inconsistency of the consumption volume with PD-1 case rate.

Key words: consumption analysis, insulin preparations, pancreatic diabetes

Introduction. The study of insulin medication consumption volume and structure, both in retail and in hospital segment, and the comparison of them with prevalence rate of pancreatic diabetes (PD) in Ukraine enable to evaluate the real provision and consumption structure as of this group of medicaments. The data of this analysis also reflect correspondence of their application to the contemporary treatment strategies and call for revision of PD therapy irrational schemes (less clinically and cost-effective).

Now, a priority issue is application of strategies, providing glycemia stabilization and support of its objective values, which would help to reduce the advanced development of complications, disability, mortality of PD patients and resulting costs for both the state and the patient. Recently, the world insulin market has felt an increase of consumption level of insulin analogous group, having particular advantages over human insulin and insulin of animal origin.

The research has studied volumes and structure of insulin preparations group consumption based on data of hospital and retail segment of pharmaceutical market of Ukraine for evaluation of PD patients provision with insulin preparations.

Materials and methods of study. The target of the study is the insulin group medication consumption data of the market research analytical system "PharmXplorer/Pharmstandard" of "Proxima Research" company. The consumption level of medicinal preparations has been evaluated with ATC/DDD methodology in terms of DDDS/1000 persons/day. This index shows a ratio of the population receiving a certain treatment. A comparative analysis of insulin consumption has been carried out based on data of years 2008-2012.

Results and discussions. The analysis of insulin medication consumption in pharmaceutical market of Ukraine has put its types as follows: group A10A B –ultra-short acting insulin – USAI (analogues of human insulin) and short acting –SAI (soluble engineered human insulin and pig insulin); group A10A C – insulin of action of average duration and its analogues - IADA (engineered human insulin and pig insulin); group A10A E – long acting insulin - LAI (analogues of human insulin); group A10A D - 2-exponential insulin (mixture of SAI and neutral protamine hagedorn and mixture of USAI and neutral protamine hagedorn).

The comparative analysis of insulin preparations consumption within 5 year period has shown the total consumption volume reduction in terms of DDDS/1000 persons/day for 29.65% in 2012 compared to 2008, which is difficult to comment due to the increase of the registered PD-1 patients number for 14.37% compared to 2008 (table 1).

Comparatively to the other countries, the consumption level of insulin preparations in Ukraine is very low. For instance, the total volume of consumption in France, Germany, Great Britain, Australia is 13.84, 29.15, 19.09, 17.4 DDDS/1000 persons/day, correspondingly [10]. In Lithuania it was 8.5 DDDS/1000 persons/day in 2008, in Norway – 18.87 and 18.88 DDDS/1000 persons/day in 2008 and 2012 correspondingly, compared to 4.86 и 3.44 DDDS/1000 persons/day in Ukraine within the same periods (table 1) [11,12].

At comparison of consumption data with the disease rate in Ukraine, it has been determined, that provision of PD-1 patients with insulin preparations, not considering their application for treatment of PD-2 patients, has been 289.68 days of treatment per year per one patient in 2012. In terms of the registered PD-1 patient number, 79.61% of them are provided with 1 DDD of total insulin

daily. The obtained data show the non-conformance of consumption volume to the incidence. Besides, the real provision of insulin medicaments is much lower, as far as calculations do not consider data as of insulin-taking PD-2 patients, though their incompleteness due to the on-going formation of actual register of PD patients in Ukraine. The rate of insulin consumption within 2008-2012 in terms of DDDS/1000 persons/day is given in the table 1.

In 2012, A10A C (IADA) and A10A B (SAI и USAI) groups took the lead in the insulin consumption structure as of the total consumption volume, with the rate of 37.21% and 34.88%, correspondingly. The rate of A10A D group (mixture of SAI and neutral protamine hagedorn, mixture of USAI and neutral protamine hagedorn) is 25.29%. Rather a small consumption volume is registered for A10A E group – 2.82%.

A group of prandial insulin (A10A B), used for control of postprandial blood glucose (PBG), is represented with USAI and SAI. The total volume of their consumption was at the level of 1.76 and 1.20 DDDS/1000 persons/day in years 2008 and 2012, which was much lower than in Norway, for instance, for the same periods (6.82 and 7.22 DDDS/1000 persons/day correspondingly) [12]. SAI took the lead in A10A B group with the rate of 96.02 and 91.67%, correspondingly in 2008 and 2012. In absolute terms, their consumption rate was 1.69 DDDS/1000 persons/day in year 2008, and went down for 34.91% to 1.10 DDDS/1000 persons/day in 2012. There was a slight increase (from 2.98% to 9.01%) of their rate in A10A B group of USAI. Their consumption rate increased from 0.065 in 2008 to 0.096 DDDS/1000 persons/day in year 2012. To put this in perspective, the data of 2008 illustrates that the consumption rate of SAI group in Lithuania takes about 9%, and consumption rate of ISAI group – insulin asparagine, insulin glusilin, insulin lispro – is 49%, 27% and 15% respectively. We should mention a substantial reduction of pig insulin consumption (for 95.83%) in 2012 compared to 2008 (from 0.05 to 0.002 DDDS/1000 persons/day). The rate of Ukrainian insulin has reduced for 15.25% compared to the initial period. This way, the carried out structural analysis of insulin, applied for PBG control, evidences low USAI consumption, compared to SAI.

In comparative aspect, USAI have optimal pharmaco-kinetical profile, out of prandial insulin group, corresponding to endogenic peak insulin secretion of a healthy human. As opposed to SAI they start quickly, provide concordance of blood insulin concentration peaks with PBG peak, and have more active elimination, avoiding the layover effect, and thus preventing development of hypoglycemic state. Human engineered SAI is of its best effect only after suction of the most part of carbohydrates after meals, and this way, insulin effect reaches the hyperglycemia, which has already emerged. Besides, insulin level in plasma is still high for up to 6 hours, which increases risk of hyperglycemia development before next meals. Considerable variability of daily insulin action profiles has been also recoded at SAI, with differences in peak concentration of up to 20-30%, which makes individual selection of effective preparation dose more difficult [1,4]. The listed parameters significantly reduce effectiveness of SAI as of PBG control.

We should mention, that PBG control is an important component of cardiovascular pathology progress prevention, as far as fast and great increase of blood glucose indices after meals, and not fasting glycemia, are a direct factor for formation of endothelial dysfunction, atherosclerosis progression and diabetes complication. PBG control together with fasting glycemia and HbA1 is recommended for PD treatment as an important index, reflecting the state of metabolic control [1,4]. Obviously, prevailing application of SAI in Ukraine can be grounded with the price factor. 1 DDD SAI costs 0.41 to 0.58, while USAI costs 1.15 to 1.48 € per 1 DDD. Putting this in perspective, in the Netherlands, Sweden, Great Britain 1 DDD USAI costs less – that is 0.95 to 1.12 €. The given data justifies the availability of SAI. IADA group has shown the greatest consumption volume among insulin preparations, applied for substitutive basal insulin therapy (A10A C (IADA) and A10A D (LAI) group) within the period under study. Its rate in the group of basal insulin preparations is 92.55% and 92.97%, and in absolute terms, it is 1.96 and 1.28 DDDS/1000 persons/day, as of 2008 and 2012 correspondingly. Compared to 2008, there was a reduction of this group consumption for 34.69% in 2012.



Within the structure of IADA consumption, the same way as with SAI consumption data, consumption of pig insulin has been greatly (for 90.38%) reduced compared to year 2008, and domestic insulin consumption remains unchanged (65.31% in 2008 and 62.11% in 2012). Further to the data of 2012, two medicinal preparations – Protafan® HM, (Denmark) and Farmasulin® H NP, (Ukraine) with consumption volume 0.44 and 0.51 DDDS/1000 persons/day are leading as of consumption in IADA group. The rate of LAI among basal insulin preparations is small and equals 7.45% based on the results of year 2008, 7.03% based on the results of year 2012, in absolute terms – 0.158 and 0.097 DDDS/1000 persons/day correspondingly. Insulin glargin has considerable consumption volume (0.09 DDDS/1000 persons/day in year 2008 and 0.073 DDDS/1000 persons/day in 2012) within the period of the study. For comparison, rate of LAI in the group of basal insulin preparations was 31.52% in Norway in 2008, 20.67% and 70.81% in Norway and Lithuania correspondingly, in 2008 [11,12].

Among insulin preparations, applied for substitutive basal insulin therapy, preparations of non-peak action - LAI (insulin glargin and insulin detemir) provide more reliable glycemic control, without regard to meals and while asleep. They imitate rather even (smooth) basal insulin secretion, are less variable, have almost a day long action (20-24 hours) and provide a clinically significant and comparative reduction of glycemia level at the same low risk of hypoglycemia development [2]. The most widely used IADA group provides for a multiple-dose introduction of the preparation within one day, coordination of injections with meals and physical loads, regular glycemia control. These restrictions negatively affect the life quality, often resulting in breach of the therapy mode and do not provide a relatively even level of basal insulinemia day long, thus enhancing the likelihood of hyperglycemia occurrence. Multiple researches, where LAI and neutral protamine hagedorn therapy are compared at their consistent glycemia level control, show LAI as having a better safety profile (as of reduction of hyperglycemia risk – acute, night, registered) [2,3].

At consideration of basal insulin preparation price in Ukraine, cost of 1 DDD IADA equals 0.41 to 0.82 €, the price of LAI is within the range of 1.89 to 2.38 € per 1 DDD. To put this in perspective, 1 DDD LAI in the Netherlands, Sweden and Great Britain costs 1.48 to 1.65 € [8].

A10A D01 preparations (mixtures of SAI and neutral protamine hagedorn insulin preparations) have the greatest consumption volume in the structure of 2-exponential insulin preparations group – 96.94% in 2008 and 97.21% in 2012. The national preparations take leading positions as of the consumption volume, based on the results of the period of research (table 1). The rate of A10A D04 - D05 group preparations consumption (mixtures of USAI and neutral protamine hagedorn insulin preparations) is not significant, their cost is 2 times higher – from 1.15 to 1.32 € per 1 DDD, compared to 0.41 – 0.58 € per 1 DDD for A10A D01 group.

This way, the evaluation of insulin preparations' consumption in the pharmaceutical market of Ukraine within the five years has shown that the consumption structure has remained almost unchanged. The preparations of human insulin - SAI and IADA, mixtures of SAI and IADA, have the highest consumption level (92.63% in 2008 and 93.43% in 2012). Preparations, which are analogous to human insulin - USAI and LAI, are used in small volume (5.21% in 2008 and 6.11% in year 2012). A slight amount of pig insulin consumption was equal to 18% in 2005, it went down to 2.16% in 2008 and to 0.2% in 2012, and in general it reflected the contemporary tendencies as of consumption of preparations of this group.

An increase of expensive analogues of insulin, reduction of human insulin consumption and great reduction of consumption of insulin of animal origin can be seen in the international market of insulin consumption. As of year 2009, less than 25 % of the countries in the world took a small amount of insulin preparations of animal origin. This way, the rate of insulin preparations of animal origin equals 0.7% compared to 2.9% in year 2000, analogues of insulin – 76.15% in 2008 compared to 10.7% in 2000 and human insulin – 23.2% in 2008 compared to 86.3% in 2000. The consumption structure of Lithuania does not contain data of insulin preparations of animal origin as of 2008, human insulin and analogues of insulin take 11.48% and 88.52% correspondingly. The rate of analogues of insulin in Denmark was 61.63% of all the insulin preparations in 2009 [7,9].

We should say that the structure of insulin world consumption market is not even and is characterized with three branches. For countries with high income level, insulin analogues compose two thirds of all the insulin preparations consumed, human insulin preparations – one third. Human insulin preparations take two thirds of all the consumed insulin preparations in countries with average income level. Consumption rate of this insulin group has been reduced in countries with low income level, however this group still has a substantial part in consumption structure (over 90% of all the insulin preparations). Globally, there are two aspects of insulin analogues consumption restraint, which are as follows: no strong proves of their advantages as of HbA1c control and the world economic crisis. Meanwhile, increase of insulin analogues consumption is based not only on certain benefits, but also on active marketing strategy of insulin manufacturers [9].

According to estimates of International insulin fund (IIF), human insulin prevail in consumption structure at its corresponding application is quite reasonable and

acceptable for countries with limited resources of health protection. The main priorities of analogous insulin preparations, compared to human insulin, are: lower frequency of hypoglycemic states, usability, improvement of treatment compliance and improvement of life quality. Together with this, there are evidences (data of meta-analyses, systematic review) that there are no significant difference between them as of provision and support of HbA1c objective values [14-16]. On that basis, some countries review and limit compensations for some categories of patients as of these analogous insulin preparations [6,13]. Experts also consider that certain advantages of insulin analogues level out with no self-control means. That is why, using of limited resources to provide all the patients with human insulin preparations and to take measures, resulting in improvement of their results (training programs, procurement of self-control appliances, test-strips and monitoring of glycemic control), is more feasible in countries with difficult economic situation.

Insufficient consumption of contemporary analogues of human insulin can be grounded not only with the limited state financing in Ukraine, but with their relatively high practice cost, compared to most countries. This way, comparatively to referent countries (main ones – Albania, Bulgaria, Turkey, Moldova, Russia, Romania and reserve ones – Hungary, Latvia, Lithuania, Czech Republic, Poland) price for insulin preparations in Ukraine differs for 17.02% - 139.08%. For example, compared to minimum price in Turkey, price of Insulin glusilin (Apidra®, Sanofi) is higher for 139.08% in Ukraine, price for insulin lispro as a compound of 2-exponential insulin (Apidra®, Sanofi), compared with a minimum price in Romania is 67.08% higher [5]. In addition, the bidding system for insulin preparations procurement, existing in Ukraine, limits the ability to change insulin therapy rapidly as per the indications, and results in irrational application of financial resources. Potentially, implementation of the program on referent prices for insulin products, which has been announced by the Ministry of health protection of Ukraine, will result in increase of provision ratio level of PD patients with analogous insulin preparations. This way, creation of due structure of insulin preparations consumption in Ukraine (increase of rate of preparations, providing proper treatment of PD patients) is to be performed at existence of evidence base as of their clinical effectiveness, evidences of economic feasibility, based on pharmaco-economic expertise and with application of referent price formation mechanism for all the preparations of the state compensation program.

Conclusions:

- rate of insulin preparations consumption by PD-1 patients, without consideration of preparations for PD-2 patients, evidence the inconsistency of the consumption volume with PD-1 case rate.
- now human insulin preparations have the highest consumption level as opposed to developed countries with high level of analogous insulin consumption;
- application of contemporary highly effective preparations of human insulin analogues (ultra-short and long acting insulin) is insufficient;
- consumption of insulin preparations in Ukraine, in terms of DDDS/1000 persons/day, compared to some European countries, is very low;
- the total consumption volume has been reduced for 29.65% in 2012 compared to year 2008;
- a necessity of pharmaco-economic expertise before introduction of any preparation to the program of state refunding has been determined.

Literature:

1. Бирюкова Е.В., Гарбузова М.А. // Сахарный диабет. – 2010. - №3(48). – С. 72-77. [Biryukova, E.V., Gribuzova, M.A.// Diabetes mellitus. – 2010. - №3(48). – P. 72-77].
2. Вербовая Н.И. // Проблемы эндокринологии. - 2010. - № 2. - С. 64-71. [Verbovaya, N.I.// Problems of endocrinology. -2010. - № 2. - P. 64-71].
3. Дедов И.И., Шестакова М.В., Моисеев С.В. // Клиническая фармакология и терапия. – 2005. - №14 (2) , <http://www.voed.ru/>. [Dedov, I.I., Shestakov, M.V., Moiseev, S.V.// Clinical pharmacology and therapy. -2005. - №14 (2) , <http://www.voed.ru/>].
4. Немченко А.С., Тораев К., Корж Ю.В.// Фармакоэкономика в Украине: стан и перспективы развития. -2013. – С.235-237. [Nemchenko, A.S., Toraev, K., Korzh, Y.V.// Pharmacoeconomics in Ukraine: stature and perspectives of developments. -2013. – P.235-237].
5. Cumming J., Mays N., Daube J. //BMJ. 2010; 340; 2441 с.
6. Currie CJ, Peters JR, Evans M.// Diabet Med. 2010; 27:744–752.
7. Drummond M., Jonsson B., Rutten F., Stargardt T. //Eur J Health Econ. 2011; 12:263–271.
8. Gill G.V., Yudkin J.S., Keen H., Beran. D. // Diabetologia. 2011; Jan; 54(1): 19-24.
9. <http://www.irdes.fr/EspaceAnglais/Publications/IrdesPublications/QES187.pdf>.
10. <http://vddb.library.lt/fedora/get/LT>.
11. <http://www.fhi.no/dokumenter/5cf2f40d01.pdf>.
12. http://www.idf.org/German_analogue_insulin_issue, accessed 15 June 2010.
13. Monami M, Marchionni N, Mannucci E. // Diabetes Reseach and Clinical Practice. 2008; 81(2):184-9.
14. Singh S.R, Ahmad F, Lal A et al. /Canadian Medical Association Journal. 2009; 15; 180(4): 385-97.
15. Vardi M, Jacobs E, Nini A et al. // Cochrane Database Systematic Review, 2008; 16 (3).

Table 1.

Dynamics of insulin consumption within years 2008-2012 in terms of DDDS/1000 persons/day.

ATC code	Insulin type	Trade name	DDDS/1000 persons/day		Δ,%
			2008	2012	
1		2	3	4	5
Group of prandial insulin - A10A B					
A10A B01, A10A B03 short acting	Engineered human insulin	Actrapid® HM Penfill® (Denmark)	0,48	0,45	- 6,25
		Gensulin P. Bioton (Poland)	-	0,005	-
		Insuman® Rapid. Sanofi (France)		0,01	-
		Farmasulin® H. Farmak (Ukraine)	0,55	0,37	- 32,73
		Humadar® P100P. Indar (Ukraine)	0,57	0,24	- 57,89
		Humulin® Regular. Eli Lilly (USA)	0,04	0,02	- 50,0
		Total: abs. / % of the consumption volume in A10A B01. A10A B03 group	1,64 / 97,04	1,10 / 99,82	- 67,07
	Pig insulin	Monodar®. Indar (Ukraine)	0,05 / 2,96	0,002 / 0,18	- 95,83
Total consumption in A10A B01, A10A B03 group : abs. / %			1,69 / 100	1,102 / 100	- 34,91
A10A B04, A10A B05, A10A B06 ultra-short acting	Insulin lispro	Humalog®. Eli Lilly (USA)	0,005	0,005	-
	Insulin asparagin	Novorapid® Flexpen®. Novo Nordisk (Denmark)	0,06	0,055	- 8,33
	Insulin glusilin	Apidra®. Sanofi (France)	-	0,036	-
	Total consumption in A10A B04, B05, B06 group : abs. / %			0,065 / 100	0,096 / 100
Total in A10A B group: abs/ % of the total volume of all insulin consumption			1,76 / 36,21	1,20 / 34,88	- 31,82
Group of basal insulin - A10A C					
A10A C01, A10A C03 action of average duration and analogues	Human insulin	Gensulin H, Bioton (Poland)	-	0,009	-
		Insuman® Basal, Sanofi (France)	-	0,017	-
		Protafan® HM, Novo Nordisk (Denmark)	0,65	0,44	- 32,31
		Farmasulin® H NP, Farmak (Ukraine)	0,69	0,51	- 26,08
		Humadar® B100P, Indar (Ukraine)	0,54	0,28	- 48,15
		Humulin® HFX, Eli Lilly (USA)	0,032	0,021	- 34,38
		Total in group: abs. / % of the consumption volume in A10A C01, A10A C03 group	1,91 / 97,45	1,27 / 99,22	- 66,49
	Pig insulin	Monodar® B, Indar (Ukraine)	0,052 / 2,55	0,005 / 0,78	- 90,38
Total consumption in A10A C group: abs. / %			1,96 / 100	1,28 / 100	- 34,69
Total in A10A C group: abs/ % of the total volume of all insulin consumption			1,96 / 40,33	1,28 / 37,21	- 34,69
Group of basal insulin - A10A E					
A10A E04, A10A E05 long acting	Insulin glargin	Lantus®. Sanofi (France)	0,09	0,073	- 18,89
	Insulin detemir	Levemir® FlexPen® (Denmark)	0,068	0,024	- 64,71
Total in A10A E group: abs / % of the total volume of all insulin consumption			0,158 / 3,25	0,097 / 2,82	- 38,61
Total in group of basal insulin (A10A C and A10A E): abs/ % of the total volume of all insulin consumption			2,12 / 43,62	1,38 / 40,12	- 65,09
Group of 2-exponential insulin - A10A D					
A10A D01, Mixture of short acting and neutral protamine hagedorn insulin	2-exponential Engineered human insulin	Insumal® COMB 25, Sanofi (France)	-	0,027	-
		Mixtard® 30 HM, Novo Nordisk (Denmark)	0,12	0,04	- 65,0
		Farmasulin® H 30/70, Farmak (Ukraine)	0,34	0,48	- 29,17
		Humadar® K25, Indar (Ukraine)	0,48	0,29	- 30,58
		Humulin® M3, Eli Lilly (USA)	0,013	0,004	- 69,23
	Total in group A10A D01: abs. / % of the Consumption volume in A10A D group			0,95 / 99,94	0,84 / 97,67
A10A D04, A10A D05 Mixture of ultra-short acting and neutral protamine hagedorn insulin	Insulin lispro	Humalog® MIX 50, Eli Lilly (USA)	-	0,004	-
	Insulin asparagin	NovoMix® 30 Flexpen® (Denmark)	0,03	0,02	-33,33
	Total in group: abs. / % of the consumption volume in A10A D group			0,03 / 3,06	0,02 / 2,33
Total consumption in A10A D group: abs. / %			0,98 / 100	0,024 / 100	- 40,0
Total in A10A D group: abs/ % of the total volume of all insulin consumption			0,98 / 20,16	0,86 / 25,00	- 12,24
Total, general consumption of insulin preparations: abs/ %			4,86 / 100	3,44 / 100	29,22

Δ - spread of consumption volume (percentage) within the period under study.