

# ЧАСТОТНИЙ АНАЛІЗ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА СТЕАТОГЕПАТИТ

О. В. Ткачова, Н. Д. Ляшенко

*Кафедра фармакоекономіки*

*Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна*

**tkachevaov@gmail.com**

**Вступ.** Проблема нераціонального використання лікарських засобів (ЛЗ) існує в усіх країнах світу і потребує вирішення як на рівні держави, так і окремого закладу охорони здоров'я (ЗОЗ). Застосування фармакоекономічних підходів для оцінки призначень ЛЗ в реальній клінічній практиці сприяє оптимізації як фармакотерапії, так і витрат на її проведення.

**Матеріали та методи дослідження.** Був проведений частотний аналіз лікарських призначень пацієнтам зі стеатогепатитом в ЗОЗ м. Харкова. Ретроспективний аналіз проведено за даними 52 історій хвороб пацієнтів зі стеатогепатитом віком від 20 до 85 років, що проходили лікування в лікарні м. Харкова протягом 2013 року.

**Результати дослідження.** Для фармакотерапії стеатогепатиту у 52 хворих усього було призначено 75 ЛЗ, одному хворому в середньому було призначено 8 ЛЗ. Безумовними лідерами призначень стали антихолінергічні засоби: «Спазмобрю» (31) і «Дуспаталін» (21) та гепатопротектори: «Тіотриазолін» (29), «Урсохол» (19) і «Фосфоглів» (17), що узгоджується з даними клінічного протоколу фармакотерапії стеатогепатиту та підтверджує раціональність призначень ЛЗ в лікарні м. Харкова.

**Висновок.** В цілому, призначення ЛЗ пацієнтам зі стеатогепатитом можна вважати раціональними, але встановлена поліпрагмазія (в середньому 8 ЛЗ на хворого) не дозволяє зробити висновок про доцільність призначень такого числа ЛЗ. Отже, результати проведеного дослідження можуть служити підґрунтям для подальшого дослідження питань щодо проведення оцінки фармакотерапії пацієнтів зі стеатогепатитом в даному відділенні ЗОЗ.