

**ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ
НОВОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

М.А. БАВЫКИНА, Л.И. ВИШНЕВСКАЯ

Национальный фармацевтический университет,
г. Харьков, Украина

Кандидозный вульвовагинит – инфекционное поражение слизистой вульвы и влагалища, вызываемое дрожжеподобными грибами рода *Candida*, которые в качестве сапрофитов обитают на кожных покровах и слизистых оболочках здоровых людей.

В последние годы распространённость кандидозного вульвовагинита неуклонно растёт, частота его составляя 30-45% в структуре инфекционных поражений вульвы и влагалища. В настоящее время эта инфекция занимает второе место среди всех инфекций влагалища и является одной из наиболее распространённых причин обращения женщин за медицинской помощью. В США ежегодно регистрируется 13 млн случаев этого заболевания, во время беременности оно достигает 40-46 % (Horowitz В. J.). Кандидозный вульвовагинит обнаруживают у 30 % онкологических больных и у 64 % больных с различными эндокринными нарушениями. По данным J. S .Bingham) 75 % женщин репродуктивного возраста имеют, по крайней мере, один эпизод этого заболевания в течение жизни, а 50 % и повторный, 5 % женщин планеты страдают рецидивирующим кандидозным вульвовагинитом. Значительное учащение случаев кандидозного вульвовагинита обусловлено действием ряда предрасполагающих факторов: механические, физиологические, эндокринные, ятрогенные и др.

Целью нашей работы было создание нового лекарственного препарата – комбинированных суппозиториев для лечения кандидозного вульвовагинита.