

ОЦІНКА ТЕРАПІЇ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ЗА ДАНИМИ VEN-АНАЛІЗУ

Ткачова О.В., Мінова К.О.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

feknfau@ukr.net

Цироз печінки (ЦП) займає значне місце в структурі захворювань органів травлення, залишаючись украй актуальною соціально-економічною і клініко-епідеміологічною проблемою охорони здоров'я усіх країн світу. Це пов'язано з широкою поширеністю основних етіологічних чинників ЦП у вигляді розповсюдження гепатотропних вірусів, що поєднуються із зростанням споживання алкоголю, а також високим рівнем смертності.

Метою дослідження стало проведення формального VEN-аналізу лікарських призначень у 53 хворих, що проходили лікування цирозу печінки (ЦП) в лікарні м. Харкова протягом 2013 року. VEN-аналіз був проведений для оцінки відповідності фармакотерапії чинним нормативним документам з позиції наявності або відсутності їх у Національному Формулярі лікарських засобів (ЛЗ) України (5 видання) та в клінічних протоколах лікування ЦП та супутніх захворювань.

Згідно з отриманими результатами, із 110 ЛЗ, призначених для лікування ЦП в Державному формулярі були наявні 97 ЛЗ (88 % від усіх ЛЗ), їм присвоєно ранг «V», а 13 ЛЗ (12 %) віднесені до категорії «N» у зв'язку з їх відсутністю в даному документі. У клінічних протоколах лікування ЦП та супутніх захворювань були наявні 98 ЛЗ (89 %), що віднесені до групи «V», а 12 ЛЗ (11 %) – віднесені до категорії «N». До обох нормативних документів не увійшли 7 ЛЗ (6,4 %) – Нейробіон, Мілдронат, Мукоген, Вазонат, Орципол, Магнікум, Тіоцетам, що свідчить про їх недостатню доказову базу.

Отже, проведений VEN-аналіз показав необхідність корекції фармакотерапії ЦП у фармакотерапевтичному відділенні ЗОЗ м. Харкова, оскільки від 6,4% до 12% призначуваних лікарями ЛЗ для терапії ЦП відсутні у чинних нормативних документах.